

تشخیص و درمان کهیر: به روزرسانی راهنمای باليینی عملی انجمن متخصصین پوست ايران

کهیر از بیماری‌های شایع و چالش‌برانگیزی است که تشخیص و درمان آن تنها به رشته‌ی تخصصی بیماری‌های پوست محدود نمی‌شود. پزشکان عمومی، متخصصان آرژی و ایمونولوژی باليینی نیز به طور شایعی با موارد این بیماری مواجه شده و درگیر تشخیص، درمان و پیشگیری از عود آن می‌شوند. انجمن متخصصین پوست ایران راهنمای باليینی تشخیص و درمان کهیر ایران را در بهار ۱۳۹۴ با درنظرگرفتن مقالات علمی منتشرشده تا انتهای سال ۲۰۱۴ میلادی تدوین کردند. گایدلاین فعلی نسخه‌ی به روزرسانی شده‌ی راهنمای سابق است که با بررسی مقالات چاپ شده از ابتدای سال ۲۰۱۵ تا آگوست ۲۰۱۸ تهیه شده است.

کلیدواژه‌ها: کهیر، تشخیص، درمان، آنتی‌هیستامین‌ها، راهنمای باليینی

دریافت مقاله: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

پوست و زیبایی؛ پاییز ۱۳۹۷، دوره‌ی ۹ (۳): ۱۸۱-۲۰۷

نویسنده‌گان این مقاله، اعضای کارگروه تدوین راهنمای باليینی تشخیص و درمان کهیر انجمن متخصصین پوست در ایران هستند که اسامی آنان به ترتیب حروف الفباء، فهرست شده است.

۱. دکتر علیرضا فیروز^۱
۲. دکتر وحیده لاجوردی^۲
۳. دکتر پروین منصوری^۳
۴. دکتر منصور نصیری کاشانی^۴
۵. یاسمین نوروزی^۵
۶. دکتر فرهاد هنجنی^۶

۱. مرکز آموزش و پژوهش بیماری‌های پوست و جذام، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
۲. مرکز کارآزمایی باليینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
۳. گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
۴. مرکز تحقیقات بیماری‌های اتوایمیون تاولی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
۵. مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
۶. ع شرکت دارویی نوارتیس آگ، تهران، ایران
۷. گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
۸. مرکز تحقیقات مولکولی پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

نویسنده‌ی مسئول:
دکتر علیرضا فیروز

تهران، خیابان طالقانی، شماره‌ی ۴۱۵
پست الکترونیک:
alifiruz@yahoo.com

تعارض منافع: این راهنمای باليینی عملی با حمایت مالی شرکت دارویی نوارتیس آگ ایران تدوین شد. این شرکت واردکننده‌ی داروی Xolair® است. هم‌چنین در زمان تدوین این راهنمای سرکار خانم یاسمین نوروزی در استخدام شرکت دارویی نوارتیس ایران بوده‌اند.

مقدمه

عملی تشخیص و درمان کهیر، انجمن متخصصین پوست ایران نسبت به تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای هیأت علمی گروه‌ها و مراکز پژوهشی تخصصی بیماری‌های پوست اقدام نمود. این گروه مسئولیت زمان‌بندی و انجام فعالیت‌های لازم برای تدوین راهنمای مورداشاره را عهده‌دار شد.

۴. مرور نظاممند متون پزشکی مرتبط: در نخستین گام، جستجوی الکترونیک پایگاه داده‌ای «urticaria» PubMed با کلیدواژه‌های «clinical systematic review» و «guideline» در باره‌ی زمانی trial با فیلتر «title/abstract» در بازه‌ی زمانی ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی لغایت انتهای ماه آگوست سال ۲۰۱۸ میلادی انجام شد. از میان ۱۵۹ عنوان یافت شده، ۴۷ مقاله‌ی مناسب انتخاب و در به روزرسانی راهنمای مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند.

۵. تدوین راهنمای پس از ارسال منابع ذکر شده به اعضای کارگروه، اعضا نسبت به ارائه‌ی بخش‌هایی که تدوین آن‌ها را عهده‌دار بودند اقدام نمودند. هر بخش توسط تمامی اعضای کارگروه مورد بررسی قرار گرفته و بازخورد لازم به عضو تدوین کننده‌ی آن بخش ارائه می‌شد.

۶. اعتباریبخشی: به منظور اعتباریبخشی راهنمای تدوین شده، نظر اعضای محترم هیأت ممتحنه‌ی آزمون دانش‌نامه‌ی تخصصی رشته‌ی بیماری‌های پوست و مدیران محترم گروه‌های آموزشی پوست دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور درخصوص پیش‌نویس متن نهایی راهنمای اخذ و اصلاحات موردنیاز براساس بازخوردهای دریافتی انجام شد.

۷. انتشار: مقرر شد به منظور نشر راهنمای، نسخه‌ی فارسی آن در فصل‌نامه‌ی علمی پژوهشی پوست و زیبایی و نسخه‌ی انگلیسی آن در فصل‌نامه‌ی زیبایی Iranian Journal of Dermatology منتشر شوند.

كهیر بیماری شایع و چالش‌برانگیزی است که با توجه به شیوع ۱ تا ۵ درصدی آن در جامعه، تشخیص و درمان آن تنها به رشته‌ی تخصصی بیماری‌های پوست محدود نیست. پزشکان عمومی، متخصصان آلرژی و ایمونولوژی بالینی نیز به طور شایعی با موارد این بیماری مواجه شده و درگیر تشخیص، درمان و پیشگیری از عود آن می‌شوند. با توجه به رسالت انجمن متخصصین پوست ایران در ارائه‌ی راهبردهایی برای اداره‌ی هرچه بهتر مبتلایان به بیماری‌های پوستی، این انجمن با تشکیل کارگروهی نسبت به بررسی شواهد و دستورالعمل‌های موجود مرتبط و به دنبال آن تدوین راهنمای بالینی عملی تشخیص و درمان کهیر در ایران اقدام کرد^{۱۰۱}. همان‌طور که در این راهنمای ذکر شده و با توجه به گذشت ۳ سال از تدوین راهنمای و در دسترس‌بودن شواهد جدید، به روزرسانی راهنمای ضروری بود.

روش به روزرسانی

برای این هدف، فعالیت‌های زیر انجام گرفت:

۱. انتخاب موضوع: با درنظر قراردادن بروز قابل توجه کهیر و مشکلات عدیدهای که برای مبتلایان ایجاد می‌کند و با توجه به آنکه با به روزکردن دانش پزشکان در باب به کارگیری روش‌های تشخیصی و درمان‌های دارویی نوین این بیماری براساس در دسترس‌بودن آن‌ها در کشور که امکان اصلاح بالقوه‌ی خدمات ارائه شده به بیماران را فراهم می‌آورد، موضوع «kehier» با تمرکز بر انواع خودبه‌خودی و مزمن این بیماری انتخاب شد.

۲. مخاطبان: متخصصان بیماری‌های پوست که در کشور ایران به طبابت اشتغال دارند به عنوان مخاطب اصلی این راهنمای عملی بالینی در نظر گرفته شدند.

۳. برنامه‌ی کار: برای به روزرسانی راهنمای بالینی

طبقه‌بندی بالینی^{۳-۵}

طبقه‌بندی کهیر براساس تظاهرات بالینی بهتر از دسته‌بندی براساس علت بیماری است زیرا طبقه‌بندی براساس علت برای کهیر امری بسیار دشوار است. براساس علت، کهیر مزمن را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: ۱) که عامل مشخصی سبب بروز ضایعات می‌شود و ۲) Spontaneous که هیچ عامل مشخصی برای بروز ضایعات ندارد.^۶ علاوه‌بر این، طبقه‌بندی براساس ویژگی‌های بالینی می‌تواند در درمان و مدیریت مناسب بیماری مفید واقع شود. معمولاً الگوهای مختلف کهیر را می‌توان براساس تظاهرات بالینی و در صورت نیاز، آزمون‌های چالشی (Challenge tests) و نمونه‌برداری از پوست از یکدیگر افتراق داد (جدول ۱). تظاهرات کهیر در دوران کودکی و بزرگسالی مشابه است.

۱. کهیر معمولی: شایع‌ترین نوع کهیر است که با بروز ناگهانی کهیر در هر نقطه‌ای از بدن با / بدون آنژیوادم مشخص می‌شود. گرچه کهیر معمولی عموماً به صورت ناگهانی و خودبه‌خودی بروز می‌کند اما در بیشتر موارد امکان تشخیص عوامل تشدید‌کننده (مانند گرما یا فشار ناشی از لباس) وجود دارد. بنایه تعریف، در صورتی که کهیر (همراه / بدون آنژیوادم) بیش از شش هفته طول بکشد و حداقل ۲ بار در هفته بروز نماید، به آن کهیر مزمن اطلاق می‌گردد. کهیر حاد با یا بدون آنژیوادم با پایداری چند ساعت یا چند روز و عود طی ماهها و سال‌های نیز جزو گروه کهیر معمولی طبقه‌بندی می‌شود و کمتر از ۶ هفته طول می‌کشد. کهیر مزمن به ندرت تهدیدی برای جان افراد محسوب می‌گردد، اما می‌تواند باعث ایجاد مشکلات عدیدهای برای بیمار شده و به طور قابل ملاحظه‌ای کیفیت زندگی بیماران را کاهش دهد، به‌گونه‌ای که این تأثیر حتی با بیماری‌های قلبی - عروقی قابل مقایسه است.

هر دو نشریه‌ی مورداشارة به‌طور بسیار گسترده‌ای در بین متخصصان پوست ایران که مخاطبان اصلی این راهنمای هستند، توزیع می‌شوند.

۸. به‌روزرسانی: مقرر شد کارگروه تدوین، سه سال یک بار نسبت به به‌روزکردن مطالب راهنمای اقدام کند. در راهنمای تدوین شده، پس از ارائه‌ی تعریف، طبقه‌بندی، سبب‌شناسی و پاتوتیزنس انواع کهیر، نکات عملی مرتبط با تشخیص و درمان با تفصیل بیشتری مورد بحث قرار می‌گیرند.

تعريف^{۳-۵}

کهیر (urticaria)، ضایعاتی قرمزنگ، برآمده و خارش‌دار (wheal) است که به دنبال اتساع عروق، افزایش جریان خون و افزایش نفوذپذیری رگ‌های خونی در پوست تظاهر می‌کند. اندازه‌ی کهیر از چند میلی‌متر تا ضایعاتی به اندازه‌ی کف دست متغیر است. کهیرها می‌توانند به صورت منفرد یا گروهی دیده شوند. ویژگی اصلی کهیر، فعل شدن ماستوسمیت‌ها است که منجر به آزادسازی هیستامین و برخی دیگر از واسطه‌های التهابی می‌شود. این امر به نوبه‌ی خود باعث ایجاد کهیر روی پوست و خارش شدید می‌گردد.

آنژیوادم، نتیجه‌ی افزایش موضعی نفوذپذیری رگ‌ها است که بیشتر در لب، دهان، حلق، پلک و اندام تناسلی رخ می‌دهد. تورم بافتی در آنژیوادم بیشتر از آنکه با خارش همراه باشد، در دنای است.

کهیر بیشتر لایه‌های سطحی پوست تا درم پاپیلاری را درگیر می‌کند، در حالی که آنژیوادم در لایه‌های زیر مخاطی و لایه‌ی رتیکولار درم رخ می‌دهد. کهیر در ۰.۵۰٪ موارد به تنها ی و در ۰.۴۰٪ موارد به همراه آنژیوادم بروز می‌کند. در ۰.۱۰٪ موارد نیز، آنژیوادم بدون کهیر رخ می‌دهد. تورم ناشی از کهیر به صورت ناگهانی بروز کرده، ۸ الی ۱۲ ساعت به حداقل خود رسیده و تا ۲۴ ساعت رفع می‌گردد، درحالی که تورم ایجاد شده در آنژیوادم ممکن است چندین روز باقی بماند.

- در صورت تشخیص محرک‌های مزبور ممکن است با تغییر در سبک زندگی فرد مبتلا، فراوانی میزان بروز کهیر را به حداقل رسانده یا حتی از بروز آن پیشگیری کرد. شناخته شده‌ترین عوامل بروز این نوع کهیر، عوامل مکانیکی و حرارتی می‌باشد.
۳. آژیوادم: آژیوادم بدون کهیر را باید از آژیوادمی که همراه کهیر بروز می‌کند تفکیک کرد زیرا این پدیده می‌تواند نشانه‌ای از کمبود آنزیم C1 esterase inhibitor بوده یا به دنبال مصرف داروهای مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (angiotensin converting enzyme [ACE]) ایجاد گردد. گاهی این بیماران با درد شکم بدون آژیوادم قابل مشاهده مراجعه می‌کنند. آژیوادم بدون کهیر می‌تواند بدون علت شناخته شده (idiopathic) نیز رخ دهد.
۴. کهیر تماسی: این نوع کهیر صرفاً در صورت جذب ماده‌ی محرک از راه پوست یا غشاء مخاطی بروز می‌کند و هرگز به صورت خودبه‌خود ایجاد نمی‌شود. جذب پوستی یا مخاطی ماده‌ی حساسیت‌زا می‌تواند موجب بروز واکنش‌های موضعی یا سیستمیک شود. ممکن است کهیر تماسی در افرادی که حساسیت شدید مثل آلرژی شدید به لاتکس دارند، منجر به بروز آنافیلاکسی گردد.
۵. واسکولیت کهیری: این ضایعات از نظر بالینی به شکل کهیر بروز کرده ولی در حقیقت درنتیجه‌ی التهاب رگ‌های کوچک ایجاد می‌شوند که با بررسی آسیب‌شناسی مشخص می‌شود. واسکولیت کهیری می‌تواند نشانه‌ای از بیماری سیستمیک بوده و با درگیری مفصلی و کلیوی نیز همراه باشد.
۶. سندروم‌های خودالتهابی: بیماری‌هایی هستند که در آن‌ها کهیر همراه با تب، بی‌قراری و برخی دیگر از علائم سیستمیک تظاهر می‌کند. سندروم Muckle-Wells (MWS) که منجر به ناشنوایی حسی - عصبی و در مواردی آمیلوئیدوز کلیوی

جدول ۱: طبقه‌بندی بالینی کهیر

کهیر معمولی

had (حداکثر تا ۶ هفته فعال بودن مداوم بیماری)
مزمن (حداقل ۶ هفته فعال بودن مداوم بیماری به میزان حداقل ۲ بار در هفته)
دوره‌ای (حداقل ۶ هفته فعال بودن متناوب بیماری که هر حمله کمتر از ۶ هفته طول می‌کشد)

کهیر فیزیکی (القای کهیر ناشی از تحریک فیزیکی)
مکانیکی

کهیر تأخیری ناشی از فشار
درموگرافیسم علامت‌دار
آنژیوادم ارتعاشی

حرارتی

کهیر کولینرژیک
کهیر تماسی سرمایی
کهیر تماسی گرمایی

سایر موارد

کهیر آکوازنی (ناشی از تماس با آب)
کهیر آفتابی
آنفیلاکسی ناشی از فعالیت بدنی

آنژیوادم بدون کهیر

بدون علت شناخته شده
ناشی از مصرف دارو
کمبود C1 esterase inhibitor

کهیر تماسی (تماس با مواد حساسیت‌زا یا شیمیایی)
واسکولیت کهیری (التهاب عروق که با نمونه‌برداری پوست مشخص می‌شود)
سندروم‌های خودالتهابی

ارثی

سندروم‌های دوره‌ای مربوط به cryopyrin (متواسیون‌های CIASI)
اکتسابی
سندروم Schnitzler

۲. کهیر فیزیکی: کهیرهای فیزیکی بر اثر یک یا چند محرک فیزیکی به وجود می‌آیند. برخلاف کهیر معمولی، در این موارد، کهیر اساساً به دنبال قرار گرفتن در معرض محرکی خاص بروز می‌کند.

دسته از بیماران به آن‌ها آلرژی دارند، مشخص کنند. این در حالی است که در اکثر افراد مبتلا به کهیر مزمن، آلرژی غذایی علت بیماری نیست و معمولاً می‌توان آن را براساس شرح حال بالینی بیمار کنار گذاشت. از جمله عوامل شایع در عود حملات کهیر مزمن عفونت‌های ویروسی و در برخی موارد تنفس روانی (stress) می‌باشد. طبقه‌بندی نوع مزمن کهیر / آنژیوادم براساس سبب‌شناسی بیماری در جدول ۲ ارائه شده است.

۳-۵ پاتوژن

در بسیاری از موارد، علی‌رغم بررسی‌های جامعی که صورت می‌گیرد، هنوز نمی‌توان علت مشخصی را برای بروز کهیر ارائه کرد، لیکن می‌توان به برخی از علل خاص اشاره کرد. مهم‌ترین سلول دخیل در ایجاد کهیر،

می‌شود، از جمله‌ی این بیماری‌ها می‌باشد^۷. موارد ارثی معمولاً از دوران کودکی بروز می‌نمایند.

سبب‌شناسی

اداره‌ی صحیح کهیرهای مزمن و حاد متناسب به شناخت کامل علائم بالینی، سبب‌شناسی بیماری، عوامل ایجادکننده و تشیدکننده‌ی آن‌ها نیازمند است. علی‌رغم تمام بررسی‌های انجام‌شده، در ۴۰-۵۰ درصد موارد علت خاصی برای بروز کهیر مزمن یافت نمی‌شود، به همین دلیل، این نوع کهیر، کهیر ایدیوپاتیک (بدون علت شناخته‌شده) نامیده می‌شود.

اغلب اوقات مبتلایان به کهیر مزمن را به عنوان موارد بالینی آلرژی (احتمالاً ناشی از آلرژی غذایی) طبقه‌بندی کرده و تلاش می‌شود موادی را که این

جدول ۲: طبقه‌بندی سبب‌شناسی کهیر / آنژیوادم مزمن

| سبب‌شناسی بیماری | مکانیسم | مثال‌ها | بررسی‌ها |
|--|--|--|---|
| بدون علت شناخته شده (۴۰-۵۰ درصد موارد) | ناشناخته | | منفی |
| خودایمنی | آتوآنتی‌یادی خودبه‌خود IgG علیه گیرنده‌ی IgE روی ماستوپیوت‌ها یا پیوند IgE روی ماستوپیوت | همراه با التهاب خودایمن تیروئید | |
| محرك‌های فیزیکی | آزادسازی مستقیم واسطه‌های شیمیایی از ماستوپیوت‌ها | آزمایش چالشی با محرك‌های مناسب آب، آقطاب، درموگرافیسم کرایوگلوبین‌ها | فعالیت بدنی، گرمما، سرما، فشار، همانند قطعات یخ، فعالیت بدنی و ... و |
| القادشه توسط دارو | کاهش متاپولیسم کینین، تغییر سطح لوکوتربین‌ها | مهارکننده‌ی ACE (برای مورد آنژیوادم بهتنهای) و NSAID هفت‌ها یا ماه‌ها طول بکشد | بهبودی به دنبال عدم مصرف (ممکن است |
| عفونت | فعال‌سازی کمپلمان و تشکیل کمپلکس انگل‌ها، EBV، هپاتیت B و C، سروولژی براساس حال بالینی سایر ویروس‌ها | | |
| آلرژی | کهیر تماسی آلرژیک با واسطه‌ی IgE | لاتکس، حیوانات، علف‌ها، غذاها | آزمایشات جلدی، IgE اختصاصی برای مواد آلرژی‌زا |
| کمبود مهارکننده C1 | الف: ژنتیک ب: اکتسابی | الف: نوع I و II آنژیوادام ارثی ب: مربوط به پاراپروتینیمی | مهارکننده‌ی C1 و C4 |
| دگرانولاسیون ماستوپیوت‌ها با واسطه‌ای غیر از IgE | بدون واسطه | مواد مخدوش | بهبودی به دنبال عدم تماس |
| واسکولیت | التهاب رگ‌های کوچک، رسوب ایمونوگلوبولین و کمپلمان‌ها | واسکولیت کهیری | CBC، ESR ادرار، آزمون عملکرد کبد، سروولژی، هپاتیت‌های B و C، الکتروفورز، ایمونوگلوبین‌ها، غربال‌گری بیماری‌های خودایمن، C3، ANCA و نمونه‌برداری از بوست |
| اختلالات لنفوپرولیفراتیو | پاراپروتینیمی | لتفوم | وجود پاراپروتین در خون و ادرار |
| افزودنی‌های غذایی (نادر) | ناشناخته | سالیسیلات | پاسخ به عدم مصرف و عود با مصرف مجدد |

کودکان و بزرگسالان یافت می‌شوند.

کهیر مربوط به کمپلکس ایمنی

تصور می‌شود که کهیر واسکولیتی و واکنش‌های کهیر ناشی از مصرف دارو یا فراورده‌های خونی (بیماری سرم) ناشی از ایجاد کمپلکس‌های ایمنی در مویرگ‌های خونی است. فعال‌سازی کمپلمان از طریق آنافیلاکتوکسین C5a موجب افزایش آزادسازی هیستامین از ماستسل‌ها می‌شود. این آثار التهابی بر اثر واکنش متقابل آنتی‌ژن - آنتی‌بادی و تولید کمپلکس‌های ایمنی ایجاد می‌گردد (به عنوان نمونه در هپاتیت B و C، EBV، سایر عفونت‌های ویروسی و برخی عفونت‌های انگلی).

کهیر تماسی ناشی از آلرژی

اتصال IgE اختصاصی علیه آلرژن‌هایی مانند دستکش‌های لاتکس، تخم مرغ، بzac سگ و ... برروی ماستوسیت‌های پوست می‌تواند موجب بروز کهیر تماسی، آنافیلاکسی و برخی از موارد کهیرهای حاد یا معمولی دوره‌ای شود که البته معمولاً آلرژی علت بروز کهیر مزمن در بزرگسالان نیست. بهندرت تماس با برخی از مواد مانند سریک اسید یا بنزوئیک اسید و ... می‌تواند به طور مستقیم با تأثیر بر جدار عروق و احتمالاً از طریق ترشح PGD2 باعث بروز کهیر شود.

کهیر وابسته به کمپلمان

آنژیوادم مربوط به کمبود مهارکننده‌ی C1 استراز، بیشتر بر اثر کینین‌های ناشی از فعال‌سازی کمپلمان و تشکیل برادی‌کینین رخ داده و هیستامین نقش زیادی در ایجاد آن ندارد.

کهیر غیرایمونولوژیک

دگرانولاسیون ماستوسیت‌ها و بازوفیل‌ها پس از قرارگیری در معرض برخی داروهای (مانند کدئین) و سایر عوامل (مانند ماده‌ی حاجب مورد استفاده در پرتونگاری) می‌تواند بدون فعال‌سازی گیرنده‌ی IgE اتفاق افتد. مکانیسم ایجاد یا تشدید کهیر ناشی از

ماستسل‌های جلدی یا مخاطی هستند که در فرایند دگرانولاسیون، مواد واژواکتیو از قبیل هیستامین آزاد می‌کنند. هیستامین به عنوان یکی از ترکیبات اصلی بروز کهیر و آنژیوادم شناخته می‌شود. سایر مواد واسطه‌ای مانند لوکوتربین‌ها و پروستاکلاندین‌ها که از غشای سلول‌ها منشأ می‌گیرند نیز متعاقباً آزاد شده و در فازهای ابتدایی و انتهایی واکنش‌ها با اثر بر بافت‌های سطحی نقش خود را ایفا می‌کنند. با وجود آنکه بعضی تظاهرات فعالیت ماستوسیت‌ها نظری خارش و تورم به‌سادگی قابل شناسایی بوده و معمولاً به آنتی‌هیستامین‌ها واکنش نشان می‌دهند، بررسی میزان التهاب در لایه‌های عمیق‌تر پوستی دشوارتر است و احتمالاً مکانیسم‌های بیشتری در رخداد آن‌ها دخالت دارند. واسطه‌های التهابی متعددی موجب افزایش تراوش‌پذیری مویرگ‌های ریز و تراوش پلاسمای ایجاد می‌شوند. بررسی آسیب‌شناختی نمونه‌های پوستی (biopsy) از ضایعات مربوط به کهیر خودایمن و کهیر مزمن ایدیوپاتیک نشان‌دهنده‌ی ارتشاچ دور عروقی لنفوسیست‌های CD4+، مونوسیت‌ها و گرانولوسیت‌ها (نوتروفیل، بازوفیل و ائوزینوفیل‌ها) می‌باشد. این امر برخلاف نمونه‌برداری‌های انجام‌شده از بیماران مبتلا به واسکولیت کهیری (کمتر از ۱٪ موارد) می‌باشد که در آن‌ها تنها واسکولیت عروق کوچک (اغلب ناشی از تشکیل کمپلکس ایمنی) مشاهده می‌شود. البته، در برخی از بیماران فقط تغییرات مختص‌به‌صورت التهاب سلول‌های اندوتیال، تراوش گلbul‌های قرمز و در برخی موارد ارتشاچ گلbul‌های سفید دیده می‌شود.

کهیر ایمونولوژیک

کهیر خودایمن

حداقل ۳٪ از بیماران دچار کهیر مزمن ایدیوپاتیک دارای اتوآنتی‌بادی‌های آزادکننده‌ی هیستامین هستند. آنتی‌بادی‌های IgG علیه گیرنده‌ی IgE برروی ماستوسیت در ۴۰-۶۰ درصد موارد کهیر مزمن در

جدول ۳: نکات مهم در شرح حال بالینی کهیر

| |
|---|
| ۱. زمان شروع بیماری |
| ۲. تناوب و طول مدت فاکتورهای تحریک کننده کهیر |
| ۳. تغییرات روزمره |
| ۴. قوچ علائم در رابطه به روزهای آخر هفته، تعطیلات و تعطیلات خارج از کشور |
| ۵. شکل، سایز و پراکندگی کهیر |
| ۶. عرباط با آنژیوادام |
| ۷. عالم فردی بیماری؛ به عنوان مثال خارش و درد |
| ۸. سابقه‌ی فردی یا خانوادگی کهیر، آتوپی |
| ۹. سابقه‌ی حساسیت، عفونت، بیماری‌های داخلی یا علل دیگر |
| ۱۰. بیماری‌های روان تنی یا بیماری‌های روان پزشکی |
| ۱۱. ایمپلت‌های جراحی و رخدادهایی حین عمل جراحی، به عنوان مثال بعد از بی‌حسی موضعی |
| ۱۲. مشکلات شکمی یا روده‌ای |
| ۱۳. تحریک توسط محرك‌های فیزیکی یا ورزش کردن |
| ۱۴. استفاده از داروها (مثل NSAIDها، تزریقات، اینمنی‌سازی، هورمون‌ها، مسهل‌ها، شیافها، قطره‌های گوش یا چشم یا درمان‌های آلترناتیو) |
| ۱۵. نسبت مشاهده شده با غذا |
| ۱۶. نسبت مشاهده شده با قاعده‌گی |
| ۱۷. عادات مربوط دخانیات (خصوص استفاده از تنباکوی معطرشده یا شاهدانه‌ها) |
| ۱۸. نوع شغل و کار |
| ۱۹. تفريحات |
| ۲۰. استرس |
| ۲۱. کیفیت زندگی در رابطه با کهیر مزمن و تأثیر آن بر عواطف شخص |
| ۲۲. درمان‌های سابق و پاسخ به این درمان‌ها |
| ۲۳. روش‌ها و نتایج تشخیص‌های سابق |
| * اطلاعات این جدول از گایدلاین کهیر مزمن ۲۰۱۴ اروپا استخراج شده است ^{۱۸} |

جدول ۴: آیا آرژی زمینه‌ای وجود دارد؟^{۱۹}

| |
|--|
| آیا کهیر فقط به صورت مکرر در عرض ۶۰ دقیقه (معمولًاً دقيقه‌ی نخست) پس از خوردن یک غذای خاص ایجاد می‌شود؟ |
| آیا کهیر فقط پس از غذای خاص و فعالیت ورزشی پس از آن ایجاد می‌شود؟ |
| آیا کهیر پس از تماس با لاتکس ایجاد می‌شود؟ |
| آیا کهیر پس از تماس با آرژن خاص که بیمار نسبت به آن‌ها حساس است (مثل گربه، اسب، غلتیدن روی چمن یا تماس با غذای خاص) رخ می‌دهد؟ |
| آیا کهیر می‌تواند به دلیل یکی از داروهایی باشد که بیمار دریافت می‌کند؟ (خصوص آسپرین، NSAIDها و داروهای مهارکننده‌ی (ACE |

آسپرین، داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی (NSAIDها) و شباهرژن‌های موجود در برخی از غذاها (مانند سالیسیلات‌ها، رنگ‌های آزو و نگه‌دارنده‌های مواد غذایی) همچنان نامشخص بوده، لیکن احتمالاً لوکوتین و آزادسازی هیستامین در ایجاد آن نقش دارند. اعتقاد بر این است که آنژیوادام ناشی از مهارکننده‌های ACE به دلیل مهار فرایند تجزیه‌ی کینین ایجاد می‌شود.

تشخیص و ارزیابی^{۲۰،۲۱}

اساس تشخیص کهیر، بالینی است و انجام آزمون‌های تكمیلی تنها در موارد خاص بر پایه‌ی یافته‌های بالینی توصیه می‌شود. در بیشتر موارد کهیر حاد انجام هیچ‌گونه ارزیابی آزمایشگاهی ضرورت ندارد. در کهیر مزمن خفیف نیز معمولاً نیاز به انجام بررسی‌های آزمایشگاهی نیست. در شرح حال بالینی کهیر باید به نکات مذکور در جدول ۳ توجه داشت.^۹ در صورت شک به وجود آرژی زمینه‌ای یا واسکولیت کهیری نکات ذکر شده در جداول ۴ و ۵ در ارزیابی حائز اهمیت است.^۸

طول مدت باقی‌ماندن ضایعات کهیری منفرد می‌تواند در تمایز الگوهای بالینی ذیل مفید واقع شود:

- ♦ کهیر عادی: معمولاً هر ضایعه‌ی کهیر ۲ تا ۲۴ ساعت طول می‌کشد.

- ♦ کهیر تماسی: تا ۲ ساعت باقی می‌ماند.
- ♦ کهیر فیزیکی: کهیرها ظرف یک ساعت ناپدید می‌شوند به جز کهیر تأخیری ناشی از فشار که ظرف ۲ الی ۶ ساعت بروز کرده و طی مدت ۴۸ ساعت از بین می‌رود.

- ♦ واسکولیت کهیری: معمولاً این کهیرها چند روز باقی می‌مانند.
- ♦ آنژیوادام: در صورت درمان نشدن، این پدیده ممکن است تا سه روز باقی بماند.

محرك ابزار بسیار مفیدی در تشخیص صحیح علت کهیر است. براساس یافته‌های این زمان‌بندی و نکات موجود در شرح حال بالینی، انجام آزمایشات ذیل ممکن است مفید باشد.^۸

شمارش کامل سلول‌های خونی

یافته‌های این آزمایش می‌تواند سرنخی در رسیدن به تشخیص علت کهیر باشد. به عنوان مثال افزایش شمارش اورینوفیل‌ها در عفونت‌های انگلی و واکنش‌های دارویی دیده می‌شود و در واسکولیت کهیری تعداد نوتروفیل‌ها افزایش می‌یابد.

CRP/ESR

افزایش ESR می‌تواند نشانه‌ی عفونت مزمن، واسکولیت یا پاراپروتئینمی باشد. CRP می‌تواند به عنوان نشانگر شدت بیماری یا پاسخ به درمان مورد

جدول ۵: آیا واسکولیت کهیری وجود دارد؟^۹

آیا کهیر / آنژیوادما شدیدتر از معمول به نظر می‌رسد؟

آیا خاصیات بیشتر از ۲۴ ساعت طول می‌کشد؟

آیا خاصیات بیشتر از خارش داشتن، دردناک بوده یا در لمس حساس هستند؟

آیا در پوست بیمار شواهدی دال بر خوبیزی زیرپوستی نظیر پتشی، پورپورا یا کبودی دیده می‌شود؟

آیا بیمار علائم یا نشانه‌های زمینه‌ای مثل تب، خستگی، احساس کسالت و درد مفاصل دارد؟

ارزیابی‌های تشخیصی^{۱۰}

خلاصه‌ای از روش‌هایی که در برخی مبتلایان به کهیر مورد استفاده قرار می‌گیرند در جدول ۶ ارائه شده است.

ثبت زمانی علائم

ثبت زمان بروز علائم پس از مواجهه با عوامل

جدول ۶: بررسی‌های تشخیصی توصیه شده در انواع شایع کهیر

| نوع | زیرگونه (توصیه شده) | آزمون‌های تشخیصی متداول | آزمون‌های تشخیصی تکمیلی پیشنهادی برای شناسایی عوامل زمینه‌ای و ردکردن دیگر تشخیص‌های افتراقی |
|--|---------------------------------------|-------------------------|---|
| kehier خودبه‌خودی حاد و دوره‌ای | هیچ آزمونی توصیه نمی‌شود | نه | نیاز به انجام هیچ آزمون تکمیلی نیست. |
| kehier خودبه‌خودی مزمن | CRP, ESR, CBC | نه | بررسی بیماری‌های عفونی مثل هلیکوبکتریپلوری، بررسی افزایش حساسیت نوع یک (مانند RAST)، اتوآنتی‌بادی‌های فعال، هورمون‌های تیروئید و اتوآنتی‌بادی‌ها، آزمون‌های پوستی شامل آزمون‌های فیزیکی رژیم غذایی، فاقد آرژن کاذب برای ۳ هفته، اندازه‌گیری سطح تریپتاز Autologous Serum، قطع مصرف داروها (مثل NSAID ها)، سرم، قطع مصرف داروها (مثل NSAID ها) و بیوپسی از ضایعه Skin Test |
| kehier خودبه‌خودی | kehier ناشی از سرما سرد | نه | آزمون چالش سرما با بین، آب سرد و باد عفونت‌ها |
| | kehier فشاری تأخیری | نه | تست فشاری (برای ۱۰-۲۰ دقیقه) |
| | kehier ناشی از تماس با گرما گرم | نه | آزمون چالش گرما و آزمون تحريك با آب |
| | kehier ناشی از قرارگرفتن در معرض آفات | نه | رددکردن سایر بیماری‌های پوستی که با نور ایجاد می‌شود |
| kehier درموگرافیک / kehier ساختگی (factitious) | نه | نه | پرتو فرابنفش و نور مرئی با طول موج‌های مختلف |
| kehier فیزیکی | نه | نه | با توجه به شرح حال بیمار، انجام آزمون |
| | kehier آکوآژنیک | نه | پوشیدن لباس‌های مرتبط در دمای بدن برای ۲۰ دقیقه |
| | kehier کولینریک | نه | ورزش و تحريك با دوش آب گرم |
| | kehier تماسی * | نه | Prick/Patch Test |
| | kehier یا آنافیلاکسی ناشی از ورزش * | نه | با توجه به شرح حال بیمار، انجام آزمون |
| | | نه | ورزش با / بدون غذا (قبل از دوش آب گرم) |

****:

کهیر آلرژیک یا کهیر تماسی کمک‌کننده است. در صورت منفی بودن این تست، واکنش آلرژیک با واسطه‌ی IgE نسبت به غذاها یا سایر آلرژن‌ها غیرمحتمل است.

ارزیابی اختصاصی IgE

در کهیر آلرژیک انجام آزمایش Radioallergosorbant test (RAST) یا chloramphenicol fluoroimmunoassay (CAP) می‌تواند در شناسایی IgE اختصاصی علیه آنتی‌ژن‌های خاص کمک‌کننده باشد.

آزمون پوستی با سرم خود فرد (Autologous serum skin test)

در این روش سرم خود فرد به صورت داخل پوستی به وی تزریق می‌شود. واکنش مثبت به صورت کهیر و رنگ پریدگی موضعی نشان‌دهنده‌ی وجود IgE اتوآنتی‌بادی‌های در گردش ضدگیرنده‌های بر سطح ماستسل‌ها است. این روش به عنوان ابزاری تحقیقاتی بوده و به صورت گسترده انجام نمی‌شود. روش استاندارد طلایی برای تشخیص این آنتی‌بادی‌های فعال مراکز معده‌دی قابل انجام است.

کرایوگلوبولین

نمونه‌ی لخته‌ی جمع‌آوری و در دمای ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد به آزمایشگاه ارسال می‌شود. این آزمون در کهیر سرمایی ثانویه ممکن است مثبت باشد.

آزمون‌های چالشی (challenge tests)

این آزمون‌ها در تشخیص کهیرهای فیزیکی کمک‌کننده هستند و به طور خلاصه در ادامه توضیح داده شده‌اند.

کهیر سرمایی

قطعه‌ای یخ داخل کیسه‌ی پلاستیکی به مدت ۲۰ دقیقه روی سطح ساعد قرار داده می‌شود و پس از گرم شدن، ارزیابی پوست انجام می‌گردد.

استفاده قرار گیرد^{۱۱۰}.

آزمایش کامل ادار

در موارد عفونت اداری به عنوان علت کهیر یا در گیری کلیه‌ی در واسکولیت کهیری ممکن است خون یا پروتئین در ادار ا مشاهده شود.

انگل‌شناسی

در صورت وجود ائوزینوفیلی توجیه‌نشده در خون یا سابقه‌ی مسافرت به مناطقی که انگل در آنجا شایع است، آزمایش مدفوع تازه یا در موارد خاص بررسی سرولوژی ازنظر عفونت انگلی کمک‌کننده است.

بیوپسی پوست

در مواردی که مدت هر ضایعه‌ی کهیری بیش از ۲۴ ساعت باشد یا در معاینه‌ی بیمار، پتشی، پورپورا، حساسیت در لمس ضایعات دیده شود، انجام بیوپسی پوست ضروری است. وجود علائم سیستمیک مانند تب، درد یا التهاب مغصل یا باقی‌ماندن آثار ضایعات پس از بهبود، از دیگر معیارهای لزوم انجام بیوپسی پوست است.

بررسی عملکرد تیروئید و اتوآنتی‌بادی‌های ضدتیروئید

در صورت همراهی کهیر مزمن با آنتی‌بادی‌های تیروئید در کودکان و بزرگسالان، احتمال کهیر خودایمنی مطرح می‌شود. معمولاً عملکرد تیروئید در این بیماران طبیعی است، اما پایش این گروه در طول زمان توصیه می‌شود.

کمپلمان سرم

در صورتی که همراه با آنژیوادم، کهیر نیز وجود داشته باشد، بررسی مهارکننده‌ی C1 ضرورتی ندارد. اما در موارد آنژیوادم بدون کهیر، آزمون غربالگری آنژیوادم ارثی با اندازه‌گیری C4 و مهارکننده‌ی C1 (بررسی کمی و عملکردی) ضروری است. در واسکولیت کهیری C4 و C3 باید بررسی شوند. پیش‌آگهی واسکولیت کهیری همراه با هیپوکمپلمانتی بدتر است. اندازه‌گیری کمپلمان‌ها در تشخیص موارد مشکوک به

می‌توانند ضایعات کهیری جدید ایجاد کنند و همچنین کهیر موجود را تشدید کنند. البته تأیید قطعی نقش این عوامل فقط پس از عود علائم به دنبال یک آزمون تحریکی دوسویه کور (double-blind provocation test) امکان‌پذیر است.

تنش روانی (Stress)

تنش‌های روانی می‌توانند باعث ایجاد یا تشدید خارش در برخی از موارد کهیر مزمن شوند^{۱۳}، بنابراین مشاوره‌ی روان‌پژوهی می‌تواند به برخی از بیماران کمک زیادی کند.

داروها

داروها اغلب باعث کهیر حاد می‌شوند اما می‌توانند در ایجاد کهیر مزمن هم نقش داشته باشند. اگر به دارویی مشکوک هستیم، باید مصرف آن را به کلی قطع کرده یا با دارویی از گروه دارویی متفاوتی جایگزین کرد. تا حد امکان بیمار باید از مصرف داروهای متعدد اجتناب نماید و داروهای غیرضروری حذف شوند.

داروهایی که باعث واکنش‌های غیروابسته به IgE می‌شوند (مثل آسپیرین) می‌توانند ضایعات کهیری جدید ایجاد کنند و هم ضایعات قبلی را تشدید نمایند. آسپیرین در ۳۰٪ بیماران مبتلا به کهیر مزمن می‌تواند باعث تشدید بیماری شود، بنابراین در بیمارانی که کهیر مزمن دارند توصیه می‌شود آسپیرین و سایر NSAID‌ها مصرف نشوند^{۱۴} اما بیماران معمولاً می‌توانند در پایین آسپیرین را که برای خاصیت ضدانعقادی آن مصرف می‌شود، ادامه دهند. در حالی که مهارکننده‌های آنزیم تبدیل کننده آنزیوتانسین می‌توانند آنژیوادم ایجاد کنند، بهندرت باعث ایجاد کهیر مزمن می‌شوند. با این وجود توصیه می‌شود بیماران مبتلا به کهیر مزمن (با / بدون آنژیوادم) از مصرف این داروها اجتناب کنند. سایر داروهای تشدیدکننده کهیر مزمن شامل نارکوتیک‌ها (کدئین و مورفین)، داروهای ضدبارداری خوراکی، داروهای ضدافسردگی (مثل سیتالوپرام)، استاتین‌ها و نیز الكل می‌باشند^{۱۵-۱۷}.

درموگرافیسم

با سایش ملایم پوست ارزیابی می‌شود. در صورتی مثبت است که کهیر حداکثر طی ۱۰ دقیقه ایجاد شود.

کهیر آکوازنیک (ناشی از تماس با آب)

با غوطه‌ور کردن بدن در آب ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد یا قراردادن حوله‌ی خیس دارای دمای یکسان با بدن به مدت چند دقیقه روی پوست انجام می‌شود.

کهیر کولینزیک

با ورزش کردن در محیط گرم ارزیابی می‌شود. اما به‌طور کلی، در بسیاری از مبتلایان به کهیر بررسی آزمایشگاهی خاصی توصیه نمی‌شود و تنها شاید برحسب علائم بیمار نیاز به انجام برخی آزمایشات باشد. شکل ۱ به‌طور خلاصه رویکرد تشخیصی به کهیر و آنژیوادم را نشان می‌دهد.^۸

درمان


در درمان هر بیمار مبتلا به کهیر باید دو رویکرد را در پیش گرفت: شناسایی و در صورت امکان حذف عوامل ایجادکننده یا تشدیدکننده (با توجه به آنکه در بسیاری از بیماران کهیر ایدیوپاتیک بوده این امر امکان‌پذیر نیست) و درمان علامتی کهیر.

الف) شناسایی و حذف عوامل ایجاد / تشدیدکننده‌ی کهیر

اولین قدم در درمان کهیر شناسایی و حذف عوامل ایجادکننده یا تشدیدکننده است. گروه قابل توجهی از بیماران، کهیر مزمن و کهیر فیزیکی را توأمًا دارند که شناسایی آن‌ها در درمان درازمدت کهیر اهمیت دارد. در بیمارانی که کهیر فیزیکی دارند، با اتخاذ راهکارهای مناسبی می‌توان به درمان بیماری کمک کرد^{۱۲-۱۳}.

عفونت و غذاها

در کهیر معمولی حاد و مزمن، درمان عفونتها یا بیماری‌های التهابی مانند گاستریت ناشی از هلیکوبکترپیلوری یا اجتناب از برخی مواد غذایی، افروندنی‌ها و داروها می‌تواند در برخی از بیماران مفید واقع شود^{۱۴-۱۵}. برخی عوامل مثل داروهای مسکن



شکل ۱: نمودار تشخیص کهیر با / بدون آنژیوادم^۸

وجود دارد. هر عاملی که این گیرنده‌ها را در دسترس آنتی‌بادی قرار دهد، باعث بروز واکنش‌های آنافیلاکتیک می‌شود. عوامل تشدیدکننده‌ی غیرایمونولوژیک کهیر می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تعداد این گیرنده‌های آزاد و در دسترس را افزایش داده و باعث شوند این آنتی‌بادی کهیر ایجاد کند.^{۱۹}

بیماری‌های سیستمیک

کهیر مزمن می‌تواند با هیپرتیروئیدی یا هیپوتیروئیدی (تیروئیدیت هاشیموتو) همراه باشد. در برخی بیمارانی که اختلال تیروئید ندارند اما آتوآنتی‌بادی دارند، درمان با لووتیروکسین ممکن است باعث بهبودی کهیر شود.^{۱۹}

رژیم غذایی

صرف‌نکردن مواد غذایی آلرژن کاذب (pseudo-allergens) می‌تواند به بهبود کهیر مزمن کمک کند. البته باید از رژیم‌های غذایی شدید و غیرلازم هم اجتناب کرد مگر اینکه شواهد قابل قبولی برای آن وجود داشته باشد. باید توجه داشت که این مواد معمولاً تشدیدکننده‌ی کهیر هستند اما عامل آن نیستند. برخی از بیماران کهیر مزمن واکنش‌های آلرژیک کاذب را به مواد غذایی یا مواد افزودنی خوراکی (شامل رنگ‌ها و مواد نگهدارنده) نشان می‌دهند. تنها در صورتی که نقش یک ماده‌ی غذایی در ایجاد کهیر ثابت شود، باید مصرف آن را محدود کرد. در بیشتر مبتلایان به کهیر مزمن، انجام آزمون‌های آلرژی پوستی یا خونی کمکی به تشخیص بیماری نمی‌کند.^{۲۰} رژیم غذایی فاقد مواد آلرژن کاذب باید به مدت ۳ تا ۶ ماه ادامه یابد و معمولاً در ۵۰٪ این بیماران طی این مدت علائم برطرف می‌شود. باید توجه داشت که اجتناب از مصرف مواد آلرژن در کهیر ناشی از افزایش حساسیت نوع I (که نادر است) در عرض ۲۴ تا ۴۸ ساعت باعث بهبودی کهیر می‌شود، اما در مورد مواد غذایی آلرژن کاذب این رژیم باید ۲ تا ۳ هفته ادامه باید تا کهیر خوب شود. محدودیت غذایی چه در مورد مواد

عوامل فیزیکی

در بیماران مبتلا به کهیر فیزیکی، شناسایی دقیق عامل فیزیکی مربوطه و خواص فیزیکی آن اهمیت دارد (جدول ۴) با این وجود در بسیاری از این بیماران، آستانه‌ی پاسخ به عامل محرک فیزیکی بسیار پایین بوده لذا کنترل کامل بیماری غیرممکن است^{۱۲۰۱۵}. در بیمارانی که در موگرافیسم یا کهیر فشاری تأخیری دارند، اقدامات ساده‌ای مثل استفاده از کیف با بند پهنه می‌تواند در پیشگیری از بروز علائم مفید باشد. در درمان کهیر سرمایی باید به دوری از تماس با باد سرد توجه داشت و در کهیر آفتای شناسایی دقیق طول موج ایجادکننده‌ی کهیر اهمیت دارد تا بتوان ضدآفات و لامپ مناسب را برای بیمار انتخاب کرد.

عفونت‌ها

عوامل عفونی متعددی می‌توانند کهیر را ایجاد یا تشدید کنند:

• ویروس‌ها

• باکتری‌ها: عفونت‌های ریشه‌ی دندان، سینوس‌ها، کیسه‌ی صفرا، دستگاه ادراری و عفونت با هلیکوباتر پیلوری

• قارچ‌ها: عفونت‌های قارچی ناخن‌ها، کچلی پا، کاندیدا

• انگل‌ها: استروفیلوبیوز، ژیارديوز، آمبیباير و مایت‌ها. کرم‌های روده‌ای معمولاً اوزینوفیلی هم ایجاد می‌کنند اما نداشتن اوزینوفیلی، این عفونت‌ها را رد نمی‌کند.^{۳۱۸}

فرآیندهای التهابی

بیماری‌های التهابی مزمن مانند گاستریت مزمن، ازوفرانیت ناشی از ریفلاکس یا التهاب کیسه یا مجرای صفراوی هم می‌توانند عامل به وجود آمدن کهیر مزمن باشند.

خودایمنی

در برخی از بیماران مبتلا به کهیر مزمن آنتی‌بادی فعال علیه زنجیره‌ی آلفای گیرنده‌ی IgE (FcεRI) پاییز ۱۳۹۷، دوره‌ی ۹، شماره‌ی ۳

شده و هنوز هم به عنوان داروهای بدون نسخه (over the counter [OTC]) به طور شایع در درمان رینیت آرژیک، کونژونکتیویت آرژیک، کهیر، سرفه، سرماخوردگی و بی خوابی مصرف می شوند.^۹

آنتری هیستامین های H1 نسل اول به ۵ دسته دارویی تقسیم می شوند (جدول ۷). داروهای نسل اول نسبتاً چربی دوست هستند، لذا امکان عبور آنها از سد خونی مغزی وجود دارد که با اتصال به گیرنده های هیستامین موجود در سیستم عصبی موجب خواب آلودگی می شود. حداکثر غلظت این داروها پس از ۲ ساعت اتفاق می افتد و معمولاً به پروتئین ها متصل می شوند. متابولیسم آنها معمولاً از طریق آنزیم سیتوکروم P450 کبدی اتفاق می افتد، بنابراین نیمه عمر آنها در بیماران با نارسایی کبد و هم چنین بیمارانی که داروهای مهار کننده سیستم سیتوکروم P450 نظیر اریتروماپسین و کتوکونازول دریافت می کنند، ممکن است طولانی تر شود.^{۲۴}

این داروها قادر به مهار علامتی کهیر می باشند. حداکثر مهار کهیر معمولاً پس از رسیدن به حداکثر غلظت خونی داروها اتفاق می افتد بنابراین به نظر می رسد آنتری هیستامین ها بهتر است به صورت مداوم استفاده شوند نه هر زمانی که نیاز باشد.^{۲۴}

امروزه استفاده از آنتری هیستامین های نسل اول (خواب آور) برای درمان کهیر به جز در موارد خاص توصیه نمی شود. عوارض جانبی آنتری هیستامین های نسل اول در جدول ۸ آورده شده است.

جدول ۷: گروه های اصلی آنتری هیستامین های نسل نخست و مثال هایی از هر گروه^۹

| مثال | گروه دارویی |
|---------------|--------------|
| دیفن هیدرامین | اتانول آمین |
| سیپریدین | پیپروهپتادین |
| پرومتازین | فنتیازین |
| کلرفیرامین | الکیل آمین |
| هیدروکسیزین | پیپرازین |

آلرژن و چه در مورد مواد آلرژن کاذب تنها پس از اینکه نقش آنها در آزمون تحریکی دوسویه کور ثابت شد،^{۳۹،۴۰} توصیه می شود.

عوامل محیطی

گردشی گیاهان، کپک ها، اسپری ها، پشم حیوانات، مایتهای گرد و خاک خانه و دود سیگار می توانند باعث تشدید کهیر مزمن شوند. کهیر ممکن است در دوران بارداری و قبل از قاعده ای تشدید شود. کهیر مزمن همراه با ایمپلنت های ارتوپدی، پروتز دندان، آمالگام مورداستفاده در پر کردن دندان و استفاده از گزارش شده است. تنفس، افسردگی و اضطراب هم می توانند کهیر را ایجاد یا تشدید کنند.^{۱۵ و ۲۰-۲۳}

کهیر تماسی

تماس با حیوانات و برخی مواد مانند لاتکس و هم چنین بعضی غذایا از طریق مکانیسم واپسته به IgE باعث پیدایش ضایعات کهیری در محل تماس می شوند. در این صورت اجتناب از تماس با این موارد باعث کنترل بیماری می گردد.^۸

ب) درمان علامتی کهیر

آنتری هیستامین ها

واژه هی آنتری هیستامین عمده تا به آگونیست های معکوس گیرنده H1 اطلاق می شود که با اتصال به گیرنده H1 مانع اتصال و عملکرد هیستامین می گردد. معمولاً این واژه، مهار کننده های گیرنده H2 را در برنمی گیرد. آنتری هیستامین ها به دو نسل قدیم (اول) و جدید (دوم) تقسیم می شوند. آنتری هیستامین های قدیمی تحت عنوان آنتری هیستامین های خواب آور نیز نامیده می شوند و به آنتری هیستامین های نسل دوم، آنتری هیستامین های غیر خواب آور نیز می گویند.

آنتری هیستامین های نسل اول این داروها از دهه های ۴۰ و ۵۰ میلادی وارد بازار

(Levocetirizine)، لووسـتریزین (Cetirizine) و دسلوراتادین (Desloratadine) در ایران در دسترس پزشکان است. داروهای ترفنادين (Terfenadine) و استمیزول (Atemizole) بهدلیل عوارض قلبی - عروقی از جمله افزایش فاصله‌ی Q-T از بازار دارویی کنار گذاشته شده‌اند.

نام ژریک، نام تجاری، اشکال دارویی و دز توصیه‌شده برای بزرگسالان آنتی‌هیستامین‌های مهارکننده‌ی گیرنده H1 نسل دوم موجود در ایران در جدول ۹ و ویژگی‌های فارماکوکینتیک آن‌ها در جدول ۱۰ ارائه شده‌اند.

فکسوفنادین

فکسوفنادین یک آگونیست معکوس گیرنده‌ی H1 است که مانند سایر آنتی‌هیستامین‌های نسل ۲ انتخابی عمل می‌کند و از لحاظ میزان عوارض جانبی با دارونما مطابقت دارد. این دارو اگرچه از ترفنادين مشتق شده است اما برخلاف آن متابولیسم کبدی ندارد و تقریباً دستنخورده دفع می‌شود. فکسوفنادین عوارض آنتی‌کولینرژیک ندارد و مطالعات بسیاری روی انسان و حیوان بی خطری آن را از لحاظ عوارض قلبی - عروقی نشان داده است.^{۲۴}

فکسوفنادین عملکرد افراد را در رانندگی و سایر فعالیت‌هایی که نیاز به هوشیاری دارند تحت تأثیر قرار

جدول ۸: عوارض جانبی آنتی‌هیستامین‌های نسل اول

| مثال | دستگاه در گیر |
|---|---------------------------|
| سیستم عصبی مرکزی شناختی، افزایش اشتتها | خوابآلودگی، اختلال عملکرد |
| گوارش | خشکی دهان، بیوست |
| ادراری - تناسلی | سوژش ادرار، اختلال نعروظ |
| قلبی | تاقکی کاردی، آریتمی |
| دویینی | سایر عوارض |

آنتی‌هیستامین‌های نسل دوم^{۲۴}

آن‌تی‌هیستامین‌های نسل دوم نیز همانند آنتی‌هیستامین‌های نسل اول در حقیقت آگونیست‌های معکوس گیرنده‌ی H1 هستند. مشخصه‌ی این گروه نسبت حداقل دز سمی و دز درمانی دارو یا پنجره‌ی درمانی وسیع آن‌ها است. این امر، امکان استفاده از این داروها را با مقداری بیشتر از دز توصیه و پذیرفته شده‌ی آن‌ها در درمان کهیرهای مزمن فراهم می‌کند. داروهای این گروه به میزان کمتری چربی دوست هستند و خوابآلودگی کمتری ایجاد می‌کنند. هم‌چنین عملکرد آن‌ها با سیار انتخابی است و نسبت به گروه نخست عوارض آنتی‌کولینرژیک کمتری داشته یا در برخی موارد این عوارض را ایجاد نمی‌کنند. از این دسته آنتی‌هیستامین‌ها داروهای فکسوفنادین (Loratadine)، فکسوفنادین (Fexofenadine)

جدول ۹: نام ژریک و تجاری، اشکال دارویی و دز توصیه‌شده برای بزرگسالان در آنتی‌هیستامین‌های مهارکننده‌ی گیرنده‌ی H1 نسل دوم ثبت شده در ایران

| نام ژریک (تولیدکننده) | نام تجاری (تولیدکننده) | در دسترس بودن محصول با نام ژریک | در دسترس بودن با نام تجاری ثبت شده (Brand) | در دسترس بودن محصول با نام ژریک | اشکال دارویی | دز توصیه شده در بزرگسالان |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------|
| Telfast (Sanofi) | Fexofenadine | بلی | قرص ۵۰ و ۱۲۰ میلی‌گرمی یا ۶۰ میلی‌گرم روزی یک بار | بلی | قرص ۵۰ و ۱۲۰ میلی‌گرمی یا ۶۰ میلی‌گرم روزی یک بار | ۱۸۰ میلی‌گرم روزی یک بار |
| Zyrtec (Pfizer) | Cetirizine | بلی | شربت ۵ میلی‌گرم / میلی‌لیتر | بلی | قرص ۵ میلی‌گرمی شربت ۵ میلی‌گرم / میلی‌لیتر | ۱۰ میلی‌گرم روزی یک بار |
| Xyzal (Sanofi) | Levocetirizine | بلی | قرص ۵ میلی‌گرمی | بلی | قرص ۵ میلی‌گرمی | ۵ میلی‌گرم روزی یک بار |
| Claritin (Schering) | Loratadine | بلی | قرص ۵ میلی‌گرمی شربت ۵ میلی‌گرم / ۵ میلی‌لیتر | بلی | قرص ۵ میلی‌گرمی شربت ۵ میلی‌گرم / ۵ میلی‌لیتر | ۱۰ میلی‌گرم روزی یک بار |
| Clarinex (Merck) | Desloratadine | بلی | قرص ۵ میلی‌گرمی شربت ۵ میلی‌گرم / ۵ میلی‌لیتر | بلی | قرص ۵ میلی‌گرمی شربت ۵ میلی‌گرم / ۵ میلی‌لیتر | ۵ میلی‌گرم روزی یک بار |

جدول ۱۰: ویژگی‌های فارماکوکینتیک آنتی‌هیستامین‌های مهارکننده‌ی گیرنده‌ی H1 نسل دوم ثبت شده در ایران^{۱۹}

| نام دارو | سرمی (ساعت) | زمان حداکثر سطح | درصد فراهم | درصد اتصال به پروتئین | نیمه عمر (ساعت) | متابولیت فعال | دفع |
|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Fexofenadine | ۱ تا ۳ | ۸۵ | ۷۰ تا ۶۰ | ۱۴/۴ | ۸۰٪ از طریق مدفع | پیش‌داروی ترفنادین است | دفع |
| Cetirizine | ۰,۵-۱/۵ | ۷۰ | ۹۳ | ۸/۳ | بیشتر از ۷۰٪ از طریق ادرار | لوبوستیریزین | دفع |
| Levocetirizine | ۰,۷۵ | ۷۷ | ۹۰ | ۱۱ | دفع ادراری، قابل اغماض | متاپولیت فعال ستریزین | دفع ادراری، قابل اغماض |
| Loratadine | ۰,۷-۱/۳ | - | ۹۷/۱ | ۴ تا ۲ | دفع ادراری، قابل اغماض | دس‌لوراتادین | دفع ادراری، قابل اغماض |
| Desloratadine | ۳ | ۱۰۰ | ۸۷ تا ۸۲ | ۲۷ | دفع ادراری، قابل اغماض | دس‌لوراتادین | دفع ادراری، قابل اغماض |

۱۲ ساعت مهار می‌کند. تلرانس برای این دارو نیز گزارش نشده است.^{۲۴} گرچه لوراتادین اثراتی روی کانال‌های پتاسیمی دارد ولی سبب آریتمی قلبی نمی‌شود. این دارو با داروهای تأثیرگذار روی سیتوکروم P450 3A4 (CyP3A4) تداخل اثر ندارد. کاربرد اصلی این دارو در درمان کهیر مزمن است.^{۲۹}^{۳۰}.

ستیریزین

ستیریزین، متابولیت کربوکسیلیک اسید هیدروکسیزین می‌باشد. تک دز ۱۰ میلی‌گرمی دارو به شکل خوراکی قادر به مهار علائم کهیر است که می‌تواند تا ۲۴ ساعت ادامه یابد. درصورت استفاده از دز توصیه شده، علائم آنتی‌کولینرژیک آن حداقل است. در مطالعات انجام‌شده خواب آلودگی بعد از دز توصیه شده در ۱۳/۷٪ بیماران مشاهده شد، درحالی که در گروه دارونما ۶/۳٪ بیماران این عارضه را تجربه کردند. درصورت استفاده از دز بالاتر، فراوانی این عارضه بیشتر می‌شود. در بیماران با مشکلات مزمن کلیه یا کبد تعديل دز به میزان ۵ میلی‌گرم توصیه می‌شود. ستیریزین در درمان کهیر مزمن مورد استفاده قرار می‌گیرد. تداخل دارویی مهم و هم‌چنین عوارض سمتی قلبی در مورد این دارو گزارش نشده است.^{۳۱-۳۳}^{۲۵}.

لوبوستیریزین

این دارو R-enantiomer ستریزین و مهم‌ترین متابولیت آن بوده و به نظر می‌رسد از لوراتادین در مهار کهیر مؤثرتر باشد. میزان خواب‌آوری و عوارض آنتی‌کولینرژیک آن اندک است. برای درمان کهیر در

نمی‌دهد و سبب افزایش کیفیت زندگی افراد می‌شود. بی‌خطری این دارو در کودکان، مبتلایان به نارسایی کبد یا بیماری‌های کلیه و افراد مسن مشخص شده است و نیاز به تعديل دز دارو در این بیماران نیست. فکسوفنادین باعث ایجاد خواب آلودگی نمی‌شود و این اثر حتی درصورت استفاده از دزهای بیشتر از دز توصیه شده‌ی دارو نیز مشاهده نمی‌گردد. شواهدی که مقاومت به این دارو را تأیید کند، موجود نیست.^{۲۵} این دارو پس از مصرف خوراکی به سرعت جذب شده و به طور چشم‌گیری سریع‌تر از لوراتادین عمل می‌کند. طی ۱ تا ۳ ساعت به حداکثر غلظت خونی خود می‌رسد و تا ۲۴ ساعت اثرات آن ماندگار است.^{۲۶} شواهد علمی حاکی از آن است که مصرف خوراکی این دارو به میزان ۱۸۰ میلی‌گرم یک بار در روز برای درمان کهیر مزمن مؤثر است.^{۲۷} از نظر بالینی، فکسوفنادین تداخل دارویی مهمی ندارد.^{۲۸}

لوراتادین

لوراتادین یک آنتی‌هیستامین نسل جدید از دسته‌ی پیپریدین‌ها است که اثرات آنتی‌کولینرژیک، خواب‌آوری و سایر عوارض جانبی آن در محدوده‌ی دز توصیه شده به حداقل رسیده است. متابولیت فعال این دارو desloratadine است. نیمه عمر این دارو ۸ تا ۱۱ ساعت بوده و گرچه اختلال عملکرد کبد و کلیه، تأثیر مهمی بر فارماکوکینتیک دارو ندارد، در بیماران با مشکلات مزمن کبد و کلیه تعديل دز دارو لازم است. اغلب دز واحد خوراکی به مقدار ۱۰ میلی‌گرم علائم کهیر را برای

کلرفنیرامین برای مصرف در بچه‌ها مجوز دارند. کلرفنیرامین و هیدروکسیزین در بچه‌های زیر ۲ سال قابل مصرف هستند. گرچه بچه‌ها به اثرات خوابآوری دارو عادت می‌کنند اما ممکن است اختلال سایکوموتور منجر به آسیب رساندن به کودک و اختلال در تحصیل او شود. سیپروهپتادین به ویژه در کهیر سرمایی بچه‌ها مؤثر است ولی سبب افزایش اشتها می‌شود.^{۲۴}

ستیریزین و لوراتادین در درمان کهیر بچه‌های بالای ۲ سال مجوز مصرف دارند. فکسوفنادین و لووستیریزین در بچه‌های بزرگ‌تر از ۶ سال مجوز مصرف دارد. مصرف ستیریزین برای بچه‌های ۱ تا ۲ ساله با دز ۰/۲۵ میلی‌گرم به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن، ۲ بار در روز بی‌ضرر گزارش شده است.^{۲۴}

ساير داروها

این داروها در خط آخر درمان کهیر مزمن قرار می‌گيرند و تنها در مواردی که به آنتی‌هیستامین‌ها با دز کافی جواب نداده باشند، مصرف می‌شوند. درم ورد میزان کارآیی و نیز عوارض جانبی مصرف طولانی‌مدت آن‌ها اطلاعات کافی وجود ندارد و باید در این زمینه به بیمار توضیح کافی داده شود.^{۳۷ و ۳۸}

آنتاگونیست‌های گیرنده‌ی H₂

استفاده‌ی توأم از یک آنتی‌هیستامین مهارکننده‌ی H₁ و یک آنتی‌هیستامین مهارکننده‌ی H₂ مانند سایمیتیدین یا رانیتیدین احتمالاً تنها اثری مختصر دارد. تنها مورد مصرف هم‌زمان این داروها در بیمارانی است که مشکلات گوارشی دارند و از استرویید نیز استفاده می‌کنند.^{۲۳ و ۲۴}

داکسپین

داکسپین یک داروی ضدافسردگی سه حلقه‌ای است که قابلیت آنتی‌هیستامینی دارد. ثابت شده است مصرف خوراکی آن در درمان کهیر شدید مؤثر است.^{۳۹} داکسپین با دزهای ۱۰ تا ۲۵ یه بار در روز تجویز می‌شود.^{۴۰}

افراد بالای ۶ سال با دز روزانه ۵ میلی‌گرم توصیه می‌شود.^{۳۴ و ۳۵}

دلسولوراتادین

این دارو متابولیت فعال لوراتادین است که به سرعت از دستگاه گوارش جذب می‌شود و ازنظر کارایی و عوارض جانبی مشابه لوراتادین است.

صرف آنتی‌هیستامین‌ها در موارد خاص

نارسایی کلیه

لازم است در بیماران با نارسایی کلیه، دز ستیریزین، لووستیریزین و هیدروکسیزین نصف شود.^{۴۱ و ۲۴}

نارسایی کبد

در این بیماران مصرف کلرفنیرامین و هیدروکسیزین توصیه نمی‌شود.^{۴۲ و ۳۴}

بارداری و شیردهی

گرچه ثابت نشده است که آنتی‌هیستامین‌ها تراتوژن باشند، ولی مصرف آن‌ها در سه ماهه‌ی اول بارداری توصیه نمی‌شود. هیدروکسیزین تهها آنتی‌هیستامینی است که براساس توصیه‌ی کارخانه سازنده، مصرف آن در مراحل اولیه‌ی بارداری ممنوع است. کلرفنیرامین که سوابق بی‌ضرری طولانی‌تری دارد، در این موارد توصیه می‌شود. گرچه بی‌ضرری لوراتادین و ستیریزین در این دوران به اثبات نرسیده ولی این دو دارو در گروه B قرار می‌گیرند، یعنی شواهدی مبنی بر آسیب به جنین در دوران بارداری در مورد آن‌ها وجود ندارد.^{۳۵ و ۳۶}

دوران کودکی

هیچ یک از آنتی‌هیستامین‌هایی که تا کنون مجوز گرفته‌اند در بچه‌های با سن ۱۲ سال یا بیشتر ممنوعیت مصرف ندارند. از آن جایی که دز و محدودیت سنی برای هر یک از آنتی‌هیستامین‌ها در بچه‌های کمتر از ۱۲ سال متفاوت است، بهتر است پیش از تجویز دارو به اطلاعات مورد نیاز در این خصوص مراجعه شود.^۳ دیفن‌هیدرامین، هیدروکسیزین، پرومتسازین و

می‌شود. دز تأییدشده و زمان دوره‌ی درمان در کشورهای مختلف متفاوت است اما شواهد نشان داده‌اند که دز ۳۰۰ میلی‌گرم بهترین اثربخشی را دارد و شناس کنترل علائم بیماری با حداقل ۳ بار تزریق بالا می‌رود.^۵ اومالیزومب همچنین در درمان کهیرهای فیزیکی مکانیکی^{۵۳،۵۴} از جمله کهیر کولینرژیک^{۵۵}، کهیر ناشی از سرما^{۵۶}، کهیر ناشی از قرار گرفتن در معرض آفاتاب^{۵۷}، کهیر ناشی از گرما^{۵۸}، کهیر در موگرافیک / القایی^{۵۹} و همچنین کهیر فشاری تأخیری^{۶۰} مؤثر واقع شده است. در صورت قطع درمان و عود بیماری شروع مجدد درمان با اومالیزومب بلامانع و اثربخش است.^{۶۱،۶۲}

اومالیزومب به عنوان دارویی ایمن شناخته شده است. میزان عوارض جانبی بین گروه‌های آزمایشی اومالیزومب و دارونما مشابه و اکثراً خفیف و متوسط بودند.^{۴۵-۴۷} گرچه در بد و ورود دارو به بازار نگرانی‌های در مورد خطر بروز بد خیمی مربوط به مصرف دارو وجود داشت^۳، شواهد موجود بیانگر آن است که چنین ارتباطی وجود ندارد.^{۶۴-۶۶} عارضه‌ی جانبی بسیار نادر اما حائز توجه، خطر آنافیلاکسی است که در ۰/۱ تا ۲٪ بیماران احتمال رخدادن وجود دارد.^{۶۷} بخش قابل توجهی از این بیمارانی که دچار شوک آنافیلاکسی مربوط به اومالیزومب شدند، سابقه‌ی پیشین آنافیلاکسی نامربوط به اومالیزومب داشتند و علت وقوع آن مشخص نیست.^{۶۷} تزریق اومالیزومب حتماً باید توسط فردی آموزش دیده و در محلی با تجهیزات پزشکی مناسب انجام شود تا در صورت بروز علائم آنافیلاکسی برای درمان آن اقدام کند.

برای بیماران با کهیر مزمن انجام آزمایشات خونی پیش از تجویز دارو برای تعیین دز دارو و دفعات تجویز ضرورت ندارد.^{۵۱} اومالیزومب در دسته‌ی دارویی B قرار دارد و استفاده از اومالیزومب در بیماران باردار بدون خطر است و تا به امروز نشانه‌ای از خطر تراویث بودن و صدمه به چنین در مورد این دارو مشاهده نشده است.^{۶۸-۷۰}

سیکلوسپورین

پلی‌پپتیدی حلقه‌ای شامل ۱۱ اسید آمینه است که داروی سرکوب کننده‌ی ایمنی هوموال و عمدتاً ایمنی سلولی است و جهت درمان طیف وسیعی از واکنش‌های ایمنی از جمله رد پیوند آلوجرافت، حساسیت‌های تأخیری و بیماری پیوند علیه میزبان (Graft Versus Host Disease [GVHD]) مورد استفاده قرار می‌گیرد. لنفوسیت‌های T به صورت انتخابی مهار می‌گردند و همچنین تولید و آزادسازی T Cell Growth Factor, IL2 (TCGF) توسط این دارو مهار می‌گردد. سیکلوسپورین به عنوان درمانی موفق جهت درمان کهیر مزمن، با مهار آزادسازی هیستامین، لکوتین C4 و دیگر واسطه‌های ماستسل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.^{۴۱-۴۳} سیکلوسپورین در دسته‌ی دارویی C قرار دارد و به صورت ۳ تا ۵ mg/kg در روز در ۲ دز منقسم تجویز می‌شود.^{۴۴}

اومالیزومب

اومالیزومب یک آنتی‌بادی IgG1 انسانی شده مونوکلونال است که بهطور انتخابی اتصال IgE و گیرنده‌های IgE سطح ماستسل‌ها و بازووفیل‌ها را مختل می‌کند و بر طبق شواهد در درمان کهیر مزمن مقاوم به آنتی‌هیستامین‌ها عملکردی مؤثر و ایمن دارد.^{۴۵-۴۹} این دارو از سال ۲۰۱۴ برای درمان کهیر مزمن خودبودی (Chronic Spontaneous Urticaria) آنتی‌هیستامین‌ها در بیماران بالای ۱۲ سال در اروپا و آمریکا مورد تأیید قرار گرفته است. اثر درمان با اومالیزومب در برخی از بیماران از هفتاهی اول قابل روئیت است.^{۵۰} ولی باید بیمار را مطلع کرد که ممکن است دارو بلافضله تأثیر خود را نشان ندهد.^{۵۱} در درمان کهیر مزمن اومالیزومب با دزهای ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم - مستقل از میزان IgE در سرم و وزن بیمار^{۵۲} - به‌طور زیرجلدی با فواصل ۴ هفته‌ای تزریق

درمان‌های غیردارویی و رویکردهای جایگزین

هنگامی که ضایعات کهیری ظاهر می‌شوند، استفاده از دوش ولرم و ترکیبات تسکین‌دهنده‌ی پوست مانند کرم یا محلول‌های حاوی $5\% / 10\%$ منتول یا کالامین و محلول کروتمیتون 10% می‌توانند کمک‌کننده باشند. PUVA در درمان کهیر مزمن به کاررفته ولی نتایج موفقی به دنبال نداشته است. اما پاسخ به NBUVB بہتر بوده است.^{۷۵} با توجه به شیوع علائم روان‌شناختی در بیماران کهیر مزمن به نظر می‌رسد استفاده از یک درمان مکمل برای مسائل روان‌شناختی بیماران لازم باشد.^{۷۶} در شکل ۲ خلاصه‌ی رویکرد درمانی به کهیر در قالب یک الگوریتم نمایش داده شده است.

ارزیابی پاسخ به درمان

با توجه به ازمان این بیماری و تغییر شدت آن طی زمان بهتر است از یک معیار کمی جهت بررسی شدت بیماری و پاسخ به درمان استفاده کرد. رایج‌ترین ابزارها برای این منظور پرسش‌نامه‌ی Dermatology Life Quality Index (DLQI) و Urticaria Activity Score over 7 Days (UAS7) است.^{۷۷} (ضمیمه‌ی ۱).

تشکر و قدردانی

تهیه‌ی این راهنمای بالینی عملی با حمایت مالی شرکت Novartis انجام شد. اعضای کارگروه تدوین راهنمای برخود لازم می‌دانند از تمامی مسئولان بخش مدیکال شرکت Novartis بهویژه سرکار خانم دکتر لاله آتش‌بارآذر که در هماهنگی و فراهم‌آوردن شرایط لازم برای انجام تدوین این راهنمای زحمات فراوانی را متحمل شدند، قدردانی نمایند.

دایپسون


دایپسون از مشتقات سولفون است که عملکرد ضدمیکروبی و ضدالتهابی دارد و بیش از ۸۰ سال است که در درمان طیف وسیعی از بیماری‌های پوستی از جمله عفونت‌هایی مانند جذام کاربرد دارد. در ارتباط با کهیر، دایپسون به تنها یا همراه با داروهای دیگر در درمان کهیر ایدیوپاتیک مزمن مورداستفاده قرار می‌گیرد.^{۷۱ و ۷۲} تجویز دایپسون با ۱۰۰ میلی‌گرم در روز شروع شده و دز آن به تدریج و براساس جواب‌دهی به درمان پایین آورده می‌شود.

Montelukast

یک آنتاگونیست گیرنده‌ی لکوتربین است که در درمان کهیر ایدیوپاتیک مزمن استفاده می‌شود. مطالعات مختلف میزان اثربخشی آن را متفاوت گزارش کرده‌اند. در یک مطالعه‌ی تصادفی دوسویه‌ی کور اثربخشی ۲ دز روزانه 5 و 10 میلی‌گرم آن همراه با Levocetirizine روزانه 10 میلی‌گرم مقایسه شد که کارآیی دو روش درمانی به یک اندازه بود اما میزان خواب‌آلودگی و کیفیت زندگی در گروه اول بهتر بود.^{۷۳} در مطالعه‌ای جدیدتر، افزودن آن با دز ذکرشده به یک آنتی‌هیستامین در مبتلایان به کهیر مزمن ایدیوپاتیک شدید مقاوم به درمان، باعث کاهش معنی‌دار علائم آن‌ها در مقایسه با دارونما شد.^{۷۴} مونتلوكاست به صورت 10 میلی‌گرم در روز تجویز می‌شود.^{۷۴}

داروهای متفرقه

در مواردی که کهیر مزمن به درمان‌های ذکرشده فوق مقاوم باشد، بیمار دچار عوارض جانبی شده باشد یا کنتراندیکاسیون مصرف داشته باشد، می‌توان از داروهای زیراستفاده کرد؛ اگرچه شواهد قوی در مورد کارآیی آن‌ها وجود ندارد: آزاتیوپرین، مایکوفنولات موفتیل، متوتركسات، هیدروکسی کلروکین، IVIG و سولفاسالازین.^{۷۵}



شكل شماره‌ی ۲: نمودار درمان کهير

* هيدروكسي كلروكين، متوكريست، مايكوفنولات موفتييل، آزاتيوبيرين، سولفاسالازين، nUVB، IVIG

ضمیمه‌ی ۱: شاخص کیفیت زندگی در بیماری‌های پوستی

نام و نام خانوادگی: _____
 شماره‌ی بیمارستانی: _____
 تاریخ: _____
 امتحان: _____
 آدرس: _____
 تشخیص: _____

هدف از این پرسشنامه، سنجش این موضوع است که مشکل پوستی شما، طی هفته‌ی گذشته چقدر بر روی زندگی‌تان تأثیر گذاشته است. لطفاً یکی از گزینه‌ها را علامت بزنید.

| | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ۱) در طول هفته‌ی گذشته، پوست شما چقدر خارش، ناراحتی، درد یا سوزش داشته است؟ | | | |
| <input type="checkbox"/> هیچ | <input type="checkbox"/> مقدار کمی | <input type="checkbox"/> زیاد | <input type="checkbox"/> خیلی زیاد |
| ۲) در طول هفته‌ی گذشته، چقدر به‌خاطر مشکل پوستی خجالت کشیده یا دستپاچه و عصبی شده‌اید؟ | | | |
| <input type="checkbox"/> هیچ | <input type="checkbox"/> مقدار کمی | <input type="checkbox"/> زیاد | <input type="checkbox"/> خیلی زیاد |
| ۳) در طول هفته‌ی گذشته، بیماری پوستی شما چقدر مانع از رفتن به خرید یا رسیدگی به کارهای منزل یا حیاط شد؟ | | | |
| <input type="checkbox"/> ارتباطی نداشت | <input type="checkbox"/> هیچ | <input type="checkbox"/> مقدار کمی | <input type="checkbox"/> زیاد |
| ۴) در طول هفته‌ی گذشته، بیماری پوستی چقدر در نوع لباس‌هایی که می‌پوشید، تأثیر گذاشته است؟ | | | |
| <input type="checkbox"/> ارتباطی نداشت | <input type="checkbox"/> هیچ | <input type="checkbox"/> مقدار کمی | <input type="checkbox"/> زیاد |
| ۵) در طول هفته‌ی گذشته، پوست شما چقدر بر فعالیت‌های اجتماعی یا تفریحی‌تان اثر گذاشت؟ | | | |
| <input type="checkbox"/> ارتباطی نداشت | <input type="checkbox"/> هیچ | <input type="checkbox"/> مقدار کمی | <input type="checkbox"/> زیاد |
| ۶) در طول هفته‌ی گذشته، چقدر ناراحتی پوستی در انجام‌دادن ورزش برای شما مشکل ایجاد کرد؟ | | | |
| <input type="checkbox"/> ارتباطی نداشت | <input type="checkbox"/> هیچ | <input type="checkbox"/> مقدار کمی | <input type="checkbox"/> زیاد |
| ۷) در طول هفته‌ی گذشته، آیا مشکل پوستی مانع از کارکردن یا درس‌خواندن شما شد؟ | | | |
| <input type="checkbox"/> ارتباطی نداشت | <input type="checkbox"/> هیچ | <input type="checkbox"/> مقدار کمی | <input type="checkbox"/> زیاد |
| در سؤال بالا، اگر جواب «خیر» است، در طول هفته‌ی گذشته، چقدر پوست شما در کارکردن یا درس‌خواندن مشکل ایجاد کرد؟ | | | |
| <input type="checkbox"/> هیچ | <input type="checkbox"/> مقدار کمی | <input type="checkbox"/> زیاد | <input type="checkbox"/> بله |
| ۸) در طول هفته‌ی گذشته، ناراحتی پوستی چقدر در رابطه‌ی شما با همسر، دوستان نزدیک یا خویشاوندان مشکل ایجاد کرد؟ | | | |
| <input type="checkbox"/> ارتباطی نداشت | <input type="checkbox"/> هیچ | <input type="checkbox"/> مقدار کمی | <input type="checkbox"/> زیاد |
| ۹) در طول هفته‌ی گذشته، پوست شما چقدر باعث ایجاد مشکل در رابطه‌ی جنسی با همسرتان شد؟ | | | |
| <input type="checkbox"/> ارتباطی نداشت | <input type="checkbox"/> هیچ | <input type="checkbox"/> مقدار کمی | <input type="checkbox"/> زیاد |
| ۱۰) در طول هفته‌ی گذشته، چقدر از مشکلات روزمره‌ی شما مثل بهم‌ریختن و کشیف کردن منزل یا تلف کردن وقت‌تان مربوط به درمان پوست‌تان بود؟ | | | |
| <input type="checkbox"/> ارتباطی نداشت | <input type="checkbox"/> هیچ | <input type="checkbox"/> مقدار کمی | <input type="checkbox"/> زیاد |
| لطفاً بازبینی کنید که به همه‌ی سؤالات پاسخ داده باشید؛ با تشکر. | | | |

پرسشنامه‌ی زیر را طی ۷ روز متوالی پر کنید. پاسخ‌تان به پژشک شما کمک می‌کند که پی ببرد تا چه حد کهیر مزمن شما فعال است. لطفاً نمره‌ای که به تعداد کهیر شما و میزان خارش شما مربوط می‌شود را هر روز برآورد کنید و علامت بزنید. لطفاً حتماً پرسشنامه‌ی پرشده‌تان را برای ویزیت بعدی به همراه داشته باشید.

| حاصل جمع روزانه ارزیابی کهیر | | | | | | | | | | میزان خارش در روز | | | | | شدت کهیر در روز | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|------|-----------|------|------------|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|--|---|
| ۶ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | = | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | + | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | روز اول | | | | | | | | | | | | | | |
| ۶ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | روز دوم | | | | | | | | | | | | | | |
| ۶ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | روز سوم | | | | | | | | | | | | | | |
| ۶ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | روز چهارم | | | | | | | | | | | | | | |
| ۶ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | روز پنجم | | | | | | | | | | | | | | |
| ۶ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | روز ششم | | | | | | | | | | | | | | |
| ۶ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | روز هفتم | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | عدد ارزیابی کهیر طی هفت روز: | | | | | ارزیابی کهیر طی هفت روز: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ارزیابی فعالیت کهیر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">نمره</th> <th style="text-align: center;">کهیر</th> <th style="text-align: center;">خارش</th> <th style="text-align: center;">وجود ندارد</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۰</td> <td style="text-align: center;">وجود ندارد</td> <td style="text-align: center;">کم (وجود دارد اما آزاردهنده نیست)</td> <td style="text-align: center;">کم (کمتر از ۲۰ التهاب در ۲۴ ساعت)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td> <td style="text-align: center;">متوسط (آزاردهنده است اما در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد نمی‌کند)</td> <td style="text-align: center;">متوسط (۲۰ الی ۵۰ التهاب در ۲۴ ساعت)</td> <td style="text-align: center;">متوسط (آزاردهنده است اما در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد نمی‌کند)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;">شدید (بیشتر از ۵۰ التهاب در ۲۴ ساعت یا مناطق بزرگ پوشیده شده از التهاب)</td> <td style="text-align: center;">شدید (خارش شدید که کاملاً آزاردهنده است و برای خواب و فعالیت‌های روزمره مشکل ایجاد می‌کند)</td> <td style="text-align: center;">شدید (بیشتر از ۵۰ التهاب در ۲۴ ساعت یا مناطق بزرگ پوشیده شده از التهاب)</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | نمره | کهیر | خارش | وجود ندارد | ۰ | وجود ندارد | کم (وجود دارد اما آزاردهنده نیست) | کم (کمتر از ۲۰ التهاب در ۲۴ ساعت) | ۱ | متوسط (آزاردهنده است اما در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد نمی‌کند) | متوسط (۲۰ الی ۵۰ التهاب در ۲۴ ساعت) | متوسط (آزاردهنده است اما در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد نمی‌کند) | ۲ | شدید (بیشتر از ۵۰ التهاب در ۲۴ ساعت یا مناطق بزرگ پوشیده شده از التهاب) | شدید (خارش شدید که کاملاً آزاردهنده است و برای خواب و فعالیت‌های روزمره مشکل ایجاد می‌کند) | شدید (بیشتر از ۵۰ التهاب در ۲۴ ساعت یا مناطق بزرگ پوشیده شده از التهاب) |
| نمره | کهیر | خارش | وجود ندارد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۰ | وجود ندارد | کم (وجود دارد اما آزاردهنده نیست) | کم (کمتر از ۲۰ التهاب در ۲۴ ساعت) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱ | متوسط (آزاردهنده است اما در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد نمی‌کند) | متوسط (۲۰ الی ۵۰ التهاب در ۲۴ ساعت) | متوسط (آزاردهنده است اما در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد نمی‌کند) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲ | شدید (بیشتر از ۵۰ التهاب در ۲۴ ساعت یا مناطق بزرگ پوشیده شده از التهاب) | شدید (خارش شدید که کاملاً آزاردهنده است و برای خواب و فعالیت‌های روزمره مشکل ایجاد می‌کند) | شدید (بیشتر از ۵۰ التهاب در ۲۴ ساعت یا مناطق بزرگ پوشیده شده از التهاب) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

References

1. Hallaji Z, Khatami A, Robati R, et al. Management of urticaria: Iranian society of dermatology clinical practice guideline. *J Dermatology Cosmet.* 2015; 6(1): 1-22.
2. Firooz A, Hallaji Z, Khatami A, et al. Management of urticaria: Iranian society of dermatology clinical practice guideline. *Iran J Dermatology.* 2015; 18(3): 81-96.
3. Grattan C. Urticaria and Angioedema. In: Bolognia J, Jorizzo J, Schaffer J, eds. *Dermatology.* 3rd ed. China: Elsevier Saunders; 2012: 291-306.
4. Grattan C, Humphreys F, And, British Association of Dermatologists Therapy Guidelines & Audit Subcommittee. Guidelines for evaluation and management of urticaria in adults and children. *Br J Dermatol.* 2007; 157(6): 1116-23.
5. Grattan C, Sabroe R, Greaves M. Chrnoic Urticaria. *J Am Acad Dermatology.* 2002; 46: 645-60.
6. Kocatürk E, Can P, Akbas P, et al. Management of chronic inducible urticaria according to the guideline: A prospective controlled study. *J Dermatol Sci.* 2017; 87: 60-9.
7. Scarpioni R, Rigante D, Cantarini L, et al. Renal involvement in secondary amyloidosis of Muckle-Wells syndrome: marked improvement of renal function and reduction of proteinuria after therapy with human anti-interleukin-1 β monoclonal antibody canakinumab. *Clin Rheumatol.* 2015; 34(7): 1311-6.
8. Powell RJ, Du Toit GL, Siddique N, et al. BSACI guidelines for the management of chronic urticaria and angio-oedema. *Clin Exp Allergy.* 2007; 37(5): 631-50. doi:10.1111/j.1365-2222.2007.02678.x.
9. Chow SKW. Management of chronic urticaria in Asia: 2010 AADV consensus guidelines. *Asia Pac Allergy.* 2012; 2(2): 149-60. doi:10.5415/apallergy.2012.2.2.149.
10. Zuberbier T, Aberer W, Asero R, et al. The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline for the Definition, Classification, Diagnosis and Management of Urticaria: The 2017 Revision and Update. *Allergy.* 2018; 73(7): 1393-1414. doi:10.1111/ijlh.12426.
11. Maouia A, Youssef M, Leban Net al. CRP relevance in clinical assessment of chronic spontaneous urticaria Tunisian patients. *Cutan Ocul Toxicol.* 2017; 36(4): 387-92.
12. Zuberbier T, Asero R, Bindslev-Jensen C, et al. EAACI/GALEN/EDF/WAO guideline: Management of urticaria. *Allergy Eur J Allergy Clin Immunol.* 2009; 64(10): 1427-43. doi:10.1111/j.1398-9995.2009.02178.x.
13. Zuberbier T, Greaves MW, Juhlin L, et al. Management of urticaria: A consensus report. *J Investig Dermatology Symp Proc.* 2001; 6(2): 128-31. doi:10.1046/j.0022-02x.2001.00023.x.
14. Godse K. Chronic Urticaria and Treatment Options. *Indian J Dermatol.* 2009; 54(4): 310-2.
15. Yadav M, Rishi J, Nijwan S. Chronic urticaria and Helicobacter pylori. *Indian J Med Sci.* 2008; 62(4): 157-62.
16. André F, VeysseyreBalter C, Rousset H, et al. Exogenous oestrogen as an alternative to food allergy in the aetiology of angioneurotic oedema. *Toxicology.* 2003; 185 (1-2):155-60.
17. Kasperska-Zajac A, Brzoza Z, Rogala B. Sex hormones and urticaria. *J Dermatol Sci.* 2008; 52(2): 79-86.
18. Mahesh PA, Kushalappa PA, Holla AD, Vedanthan PK. House dust mite sensitivity is a factor in chronic urticaria. *Indian J Dermatol Venereol Leprol.* 2005; 71(2): 99-101. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16394382>.

19. Stadler BM, Pachlornik J, Vogel M, et al, Miescher S. Conditional autoantibodies in urticaria patients: A unifying hypothesis. *J Investig Dermatology Symp Proc.* 2001; 6(2): 150-52. doi:10.1046/j.0022-202x.2001.00031.x.
20. Axél T. Hypersensitivity of the oral mucosa: clinics and pathology. *Acta Odontol.* 2001; 59: 315-9.
21. Hallab N, Merritt K, Jacobs J. Metal sensitivity in patients with orthopaedic implants. *J Bone Jt Surg.* 2001; 83 (428-36).
22. Malhotra S, Mehta V. Role of stressful life events in induction or exacerbation of psoriasis and chronic urticaria. *Indian J Dermatol Venereol Leprol.* 2008; 74 (6): 594-9.
23. Yang H, Sun C, Wu Y, Wang J. Stress, insomnia, and chronic idiopathic urticaria-a case-control study. *J Formos Med Assoc.* 2005; 104 (4): 254-63.
24. SE W, ed. *Comprehensive Dermatologic Drug Therapy.* 3rd ed. China: Elsevier; 2013.
25. Russell T, Stoltz M, Eller M, Al. E. Acute and subchronic dose tolerance of fexofenadine HCl in healthy male subjects (Abs p. 41). *Br Soc Allergy Clin Immunol Meet Sept.* 1996.
26. Howarth P. The choice of an H1-antihistamine for 21st century. *Clin Experimental Allergy Rev.* 2002; 2(1): 18-25.
27. Handa S, Dogra S, Kumar B. Comparative efficacy of cetirizine and fexofenadine in the treatment of chronic idiopathic urticaria. *J Dermatolog Treat.* 2004; 15 (1): 55-7.
28. Mason J, Reynolds R, Rao N. The systemic safety of fexofenadine HCl. *Clin Exp Allergy.* 1999; 29(3): 163-70.
29. Clissold S, Sorkin E, Goa K. Loratadine, a preliminary review of its pharmacodynamic properties and therapeutic efficacy. *Drugs.* 1989; 37(1): 42-57.
30. Kassem N, Roman I, Gural R, et al. Effects of loratadine (SCH 29851) in suppression of histamine-induced skin wheals. *Ann Allergy, Asthma Immunol.* 1988; 60(6): 505-7.
31. Juhlin L, de Vos C, Rihoux J-P. Inhibiting effect of cetirizine on and 481804nduced wheals and flares , experimental urticaria. *J Allergy Clin Immunol.* 1987; 80: 599-602.
32. Wood S, John B, Chasseaud L, Yeh J, Chung M. The metabolism and pharmacokinetics of 14C-cetirizine in humans. *Annu Allergy.* 1987; 59: 31-4.
33. Clough G, Boutsouki P, Church M. Comparison of the effects of levocetirizine and loratadine on histamine-induced wheal, flare and itch in human skin. *Allergy.* 2001;56 (10): 985-8.
34. Conn H, Poynard T. Corticosteroids and peptic ulcer: meta-analysis of adverse events during steroid therapy. *J Intern Med.* 1994; 236(6): 619-32.
35. Schatz M, Petitti D. Antihistamines and pregnancy. *Ann Allergy, Asthma Immunol.* 1997; 78: 157-9.
36. Schatz M, Zeiger RS, Harden K, et al. The safety of asthma and allergy medications during pregnancy. *J Allergy Clin Immunol.* 1997; 100(3): 301-6. doi:10.1016/S0091-6749(97)70241-0.
37. Holm J, Ivyanskiy I, Thomsen S. Use of nonbiologic treatments in antihistamine-refractory chronic urticaria: a review of published evidence. *J Dermatolog Treat.* 2018; 29(1): 80-97.
38. Rutkowski K, Grattan C. How to manage chronic urticaria ‘beyond’ guidelines: a practical algorithm. *Clin Exp Allergy.* 2017; 47(6): 710-18.
39. Goldsobel AB, Rohr AS, Siegel SC, et al. Efficacy of doxepin in the treatment of chronic idiopathic urticaria. *J Allergy Clin Immunol.* 1986; 78(5): 867-73. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/0091-6749%2886%2990232-0>.

40. Bernstein JA, Lang DM, Khan DA, et al. The diagnosis and management of acute and chronic urticaria: 2014 update. *J Allergy Clin Immunol.* 2013; 133(5): 1270-7.e66. doi:10.1016/j.jaci.2014.02.036.
41. Wershil BK, Furuta GT, Lavigne JA, et al. Dexamethasone and cyclosporin a suppress mast cell-leukocyte cytokine cascades by multiple mechanisms. *Int Arch Allergy Immunol.* 1995; 107(1-3): 323-4. doi:10.1159/000237015.
42. USA Food and Drug Administration A. Sandimmune.http://www.accessdata.fda.gov/0D%0A/drugsatfda_docs/label/2013/050573s039,050574s04,050625s053lbl.pdf %0D%0A. Accessed March 25, 2015.
43. Marone G, Triggiani M, Cirillo R, et al. Cyclosporin A inhibits the release of histamine and peptide leukotriene C4 from human lung mast cells. *Ric Clin Lab.* 1988; 18(1): 53-9.
44. Beck LA, Bernstein JA, Maurer M. A review of international recommendations for the diagnosis and management of chronic urticaria. *Acta Derm Venereol.* 2017; 97(2): 149-58. doi:10.2340/00015555-2496.
45. Maurer M, Rosén K, Hsieh HJ, et al. Omalizumab for the treatment of chronic idiopathic or spontaneous urticaria. *N Engl J Med.* 2013; 368: 924-35.
46. Kaplan A, Ledford D, Ashby M, et al. Omalizumab in patients with symptomatic chronic idiopathic/spontaneous urticaria despite standard combination therapy. *J Allergy Clin Immunol.* 2013; 132(1): 101-9.
47. Saini SS, Bindslev-Jensen C, Maurer M, et al. Efficacy and safety of omalizumab in patients with chronic idiopathic/spontaneous urticaria who remain symptomatic on H1 antihistamines. *J Invest Dermatol* 2015; 135(1): 67-75.
48. Maurer M, Altrichter S, Bieber T, et al. Efficacy and safety of omalizumab in patients with chronic urticaria who exhibit IgE against thyroperoxidase. *J Allergy Clin Immunol.* 2011; 128(1): 202-9.
49. Zhao ZT, Ji CM, Yu WJ, et al. Omalizumab for the treatment of chronic spontaneous urticaria: A meta-analysis of randomized clinical trials. *J Allergy Clin Immunol.* 2016; 137(6): 1742-50e4.
50. Kaplan A, Ferrer M, Bernstein JA, et al. Timing and duration of omalizumab response in patients with chronic idiopathic/spontaneous urticaria. *J Allergy Clin Immunol.* 2016; 137(2): 474-81.
51. Genentech USA Inc, Novartis Pharmaceuticals Corporation. Xolair highlights of prescribing information. 2017: 1-27. http://www.gene.com/download/pdf/xeloda_prescribing.pdf.
52. Saini S, Rosen KE, Hsieh HJ, et al. A randomized, placebo-controlled, dose-ranging study of single-dose omalizumab in patients with H 1-antihistamine-refractory chronic idiopathic urticaria. *J Allergy Clin Immunol.* 2011; 128(3): 567-73.
53. Maurer M, Metz M, Brehler R, et al. Omalizumab treatment in patients with chronic inducible urticaria: A systematic review of published evidence. *J Allergy Clin Immunol.* 2018; 141(2): 638-49.
54. Metz M, Altrichter S, Ardelean E, et al. Anti-immunoglobulin E treatment of patients with recalcitrant physical urticaria. *Int Arch Allergy Immunol.* 2011; 154(2): 177-80.
55. Metz M, Bergmann P, Zuberbier T, Maurer M. Successful treatment of cholinergic urticaria with anti-immunoglobulin E therapy. *Allergy.* 2008; 63(2): 247-9.
56. Metz M, Schütz A, Weller K, et al. Omalizumab is effective in cold urticaria—results of a randomized placebo-controlled trial. *J Allergy Clin Immunol.* 2017; 140(3): 864-7.

57. Güzelbey O, Ardelean E, Magerl M, et al. Successful treatment of solar urticaria with anti-immunoglobulin E therapy. *Allergy*. 2008; 63(11): 1563-5.
58. Bullerkotte U, Wieczorek D, Kapp A, Wedi B. Effective treatment of refractory severe heat urticaria with omalizumab. *Allergy*. 2010; 65(7): 931-2.
59. Maurer M, Schütz A, Weller K, et al. Omalizumab is effective in symptomatic dermographism-results of a randomized placebo-controlled trial. *J Agric Urban Entomol*. 2017; 140(3): 870-3.
60. Bindslev-jensen C, Skov P. Efficacy of omalizumab in delayed pressure urticaria: a case report. *Allergy*. 2010; 65(1): 138-9.
61. Maurer M, Kaplan A, Rosén K, et al. The XTEND-CIU study: Long-term use of omalizumab in chronic idiopathic urticaria. *J Allergy Clin Immunol*. 2018; 141(3): 1138-9.
62. Martin M, Ohanyan T, Church MK, Maurer M. Retreatment with omalizumab results in rapid remission in chronic spontaneous and inducible urticaria. *JAMA Dermatology*. 2014; 150(3): 288-90.
63. Fernandez C, Busse W, Reisner C, Gupta N. Clinical data do not suggest a causal relationship between omalizumab therapy and cancer. *Proc Amreican Thorac Soc*. 2005; 2: A359.
64. Sussman G, Hébert J, Gooderham M, et al. Safety and tolerability of omalizumab in patients with chronic idiopathic/spontaneous urticaria: Results from the OPTIMA study. *J Am Acad Dermatol*. 2018; 79(3).
65. Long A, Rahmaoui A, Rothman KJ, et al. Incidence of malignancy in patients with moderate-to-severe asthma treated with or without omalizumab. *J Allergy Clin Immunol*. 2014; 134(3).
66. Corren J, Casale TB, Lanier B, et al. Safety and tolerability of omalizumab. *Clin Exp Allergy*. 2009; 39(6): 788-97.
67. Lieberman PL, Jones I, Rajwanshi R, et al. Anaphylaxis associated with omalizumab administration: Risk factors and patient characteristics. *J Allergy Clin Immunol*. 2017; 140(6): 1734-6.e4.
68. Namazy J, Cabana MD, Scheuerle AE, et al. The Xolair Pregnancy Registry (EXPECT): The safety of omalizumab use during pregnancy. *J Allergy Clin Immunol*. 2015; 135(2): 407-12.
69. González-Medina M, Curto-Barredo L, Labrador-Horrillo M, Giménez-Arnau A. Omalizumab use during pregnancy for chronic spontaneous urticaria (CSU): report of two cases. *J Eur Acad Dermatology Venereol*. 2017; 31(5):e245-e246.
70. Ghazanfar MN, Thomsen SF. Successful and safe treatment of chronic spontaneous urticaria with omalizumab in a woman during two consecutive pregnancies. *Case Rep Med*. 2015; 26805.
71. Wolf R, Tuzun B, Tuzun Y. Dapsone: unapproved uses or indications *Clin Dermatol*. *Clin Dermatol*. 2000;18(1): 37-53.
72. Engin B, Ozdemir M. Prospective randomized non-blinded clinical trial on the use of dapsone plus antihistamine vs. antihistamine in patients with chronic idiopathic urticaria. *J Eur Acad Dermatology Venereol*. 2008; 22(4): 481-6.
73. Sarkar T, Sil A, Pal S, et al. Letter in response to “Effectiveness and safety of levocetirizine 10 mg versus a combination of levocetirizine 5 mg and montelukast 10 mg in chronic urticaria resistant to levocetirizine 5 mg: A double-blind, randomized, controlled trial” by Sarkar et al. *Indian J Dermatology Venereol Leprol*. 2017; 84(5): 561-8.
74. Kosnik M, Subic T. Add-on montelukast in antihistamine-resistant chronic idiopathic urticaria. *Respir Med*. 2011; 105 (SUPPL. 1):S84-S88.

75. Bishnoi A, Parsad D, Vinay K, Kumaran M. Phototherapy using narrowband ultraviolet B and psoralen plus ultraviolet A is beneficial in steroid-dependent antihistamine-refractory chronic urticaria: a randomized, prospective observer-blinded comparative study. *Br J Dermatol.* 2017; 176(1): 62-70.
76. Chow FJ, Mackauer M. Host discrimination and larval competition in the aphid parasite *Ephedrus californicus*. *Entomol Exp Appl.* 1986; 41(3): 243-54.
77. Stull D, McBride D, Tian H, et al. Analysis of disease activity categories in chronic spontaneous/idiopathic urticaria. *Br J Dermatol.* 2017; 177(4): 1093-101.
78. Zuberbier T, Aberer W, Asero R, et al. Methods report on the development of the 2013 revision and update of the EAACI/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. *Allergy Eur J Allergy Clin Immunol.* 2014; 69(7).

Management of urticaria: Iranian Society of Dermatology clinical practice guideline

Alireza Firooz, MD^{1,2}
Vahideh Lajevardi, MD^{3,4}
Parvin Mansouri, MD⁵
Mansour Nassiri-Kashani, MD¹
Yasaman Norouzi, MSc⁶
Farhad Handjani, MD^{7,8}

1. Center for Research and Training in Skin Diseases and Leprosy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2. Clinical Trial Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3. Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4. Autoimmune Bullous Diseases Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5. Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6. Novartis Pharma Services AG, Iran Branch, Tehran, Iran
7. Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
8. Molecular Dermatology Research Center, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Urticaria is a common and challenging skin disorder. Diagnosis and treatment of urticaria is not limited to the field of dermatology. General physicians, allergologists and clinical immunologists are also commonly involved in the management of patients with urticaria.

Iranian Society of Dermatology developed a clinical practice guideline concerning diagnosis and treatment of urticaria that was published in 2015. The current guideline, with respect to scientific papers that got published from 2015 to August 2018, is the update it.

Keywords: urticaria, diagnosis, treatment, antihistamines, clinical guideline

Received: Nov 29, 2018 Accepted: Dec 12, 2018

Dermatology and Cosmetic 2018; 9 (3): 181-207

All authors are shared first author.

Corresponding Author:

Alireza Firooz, MD

No. 415, Taleqani Ave, Tehran, Iran
Email: alifiruz@yahoo.com

Conflict of interest: The preparation of this guideline has been sponsored by Novartis Pharma Services AG, Iran Branch which imports Xolair® to Iran. In addition, Yasaman Norouzi is an employee of Novartis Pharma Services AG, Iran Branch.