

مقایسه‌ی دو کرم ضدآفتاب در پیش‌گیری از آفتاب‌سوختگی

زمینه و هدف: با توجه به شیوع آفتاب‌سوختگی، عوارض شناخته شده و اهمیت پیشگیری از آن، مقایسه‌ای بین یک کرم ضدآفتاب برنده خارجی با $SPF=60$ (کرم الف) با یک کرم ضدآفتاب ایرانی با $SPF=50$ (کرم ب)، روی گروهی از کوهنوردان شیراز در سال ۱۳۹۶ انجام شد.

روش اجرا: این کارآزمایی بالینی روی ۵۰ نفر انجام گرفت. یک طرف صورت هر فرد به عنوان گروه مورد و طرف دیگر به عنوان شاهد انتخاب و به میزان $40/0$ میلی لیتر از کرم ضدآفتاب الف به طرف مورد و همین مقدار از کرم ب روی طرف شاهد قرار گرفت. شرکت‌کنندگان در این تحقیق ۵ ساعت در معرض آفتاب قرار داشتند. ارزیابی، ۳ ساعت بعد از شروع توسط متخصص بیماری‌های پوست و ۲۴ ساعت بعد توسط خود شرکت‌کنندگان براساس اریتم، سوزش، خارش و رضایت از فرآورده‌ها انجام شد. اطلاعات به دست آمده با آزمون‌های MC Nemar و مرربع کای برسی شدند.

یافته‌ها: کرم ب در $82/2\%$ و کرم الف در $76/2\%$ موارد موجب پیشگیری از آفتاب‌سوختگی شدند. همچنین میزان رضایت‌مندی شرکت‌کنندگان از کرم ب، 95% و از کرم الف 82% بود.

ضدآفتاب الف و ب در پیش‌گیری از آفتاب‌سوختگی تفاوت چندانی نداشتند اما از نظر سوزش و خارش و نیز میزان رضایت مصرف‌کنندگان، کرم ضدآفتاب ب، بهتر عمل کرده بود.

نتیجه‌گیری: در مجموع کرم ضدآفتاب ب از نظر عوارض و رضایت‌مندی مصرف‌کننده بهتر بود.

کلیدوازه‌ها: سوزش، خارش، ضدآفتاب، آفتاب‌سوختگی

دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

پوست و زیبایی؛ پاییز ۱۳۹۶، دوره‌ی ۸ (۳): ۱۳۱-۱۳۶

ایمان باقرپور^۱
راضیه زارع^۲

۱. باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
۲. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

نویسنده‌ی مسئول:
راضیه زارع

شیراز، میدان مطهری، مجتمع رضوان،
شماره‌ی ۴۸
پست الکترونیک:
zare.ues@gmail.com

تعارض منافع: اعلام نشده است.

مقدمه

کرم‌های ضدآفتاب یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین کرم‌های آرایشی هستند. مهم‌ترین علت استفاده از کرم‌های ضدآفتاب به دلیل محافظت از پوست و جنبه‌ی پیش‌گیری آن است. یک کرم ضدآفتاب خوب می‌تواند پوست را ساعتها از خطر پرتوهای مضر خورشید مانند اشعه‌ی فرابنفش (UV) حفظ کند و فرد را تا حدودی از ابتلاء به چروک، خشکی و آفتاب‌سوختگی، التهاب صورت، بروز لک‌های ناشی از آفتاب و مهم‌تر از همه، بیماری‌های ناشی از آفتاب در امان نگه دارد. ضدآفتاب‌های حاوی کرم پودر دارای همان خاصیت ضدآفتاب هستند ولی نوع آن و همچنین

مورد ظاهرشان می‌شوند و با سؤالات اجتماعی زیادی روبه‌رو می‌شوند^۶. قدرت محافظتی ضدآفتاب‌ها معمولاً با Sun Protection Factor (SPF) سنجیده می‌شود که عبارت است از حداقل اشعه‌ی لازم برای ایجاد حداقل اریتم پوستی که ضدآفتاب به میزان 2 mg/cm^2 بر آن مالیده شده است، نسبت به پوستی که ضدآفتاب ندارد^۷. ضدآفتاب با SPF=30 حدود ۷٪ از اشعه‌ی فرابنفش را بلوک می‌نماید و افزایش SPF تا عدد ۴۵ فقط به میزان ۱۱٪ این محافظت را افزایش می‌دهد. همچنان پژوهشگران با مقایسه‌ی کرم‌های ضدآفتاب SPF=30 با SPF=100 دریافتند که در پیش‌گیری از آفتاب‌سوختگی و برخی عوارض SPF=30 تفاوتی با هم ندارند، در صورتی که کرم SPF=100 و SPF=100 به میزان ۹٪ از آفتاب‌سوختگی جلوگیری می‌کنند^۸.

براساس مطالب یادشده می‌توان گفت راندمان و اثربخشی هر محصول ضدآفتاب فقط وابسته به عدد آن نبوده بلکه به کیفیت مواد و در حقیقت به توانایی آن محصول در بقای مؤثر در شرایط پرتنشی مثل ورزش، تعزیق طولانی یا شنا و تکرار استفاده از آن است. در هر صورت، به دلیل اینکه کرم ضدآفتاب یک راه حل نهایی نیست. سازمان‌های بهداشتی نیز بهشدت توصیه می‌کنند که از کلاه و عینک آفتابی، لباس و سایه برای محافظت از پوست خود استفاده کنید.

قلمکارپور و همکاران در مقاله‌ای اعلام کردند تنها کرم ضدآفتاب ساخت ایران مطابق با حداقل SPF توسعه‌شده از طرف سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) یعنی SPF=30 مربوط به لاپراتوار دکترلوتسیای فرانسه بوده که ادعا شده است در پیشگیری از اثرات زیان‌بار نور خورشید موفق می‌باشد^۹. یکی دیگر از کرم‌های ضدآفتاب مصرفی در ایران، توسط لاپراتور پارس‌حیان با همکاری کمپانی اشتراتمانز آلمان تولید می‌شود که ادعا شده که فرآورده‌های آن از یک سو با دارابودن بازتابنده‌های فیزیکی و جاذب پرتوهای فرابنفش مؤثر و

پوست در آمریکا از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰٪/۸۹,۵ میزان مرگ‌ومیر آن نیز طی این مدت ۸٪/۳۴,۸ افزایش یافته است^{۱۰}.

طیفی از نور خورشید که باعث اریتم (قرمزی پوست) می‌شود همان طیفی است که باعث تشکیل دایمراهای پیریمیدین شده و درنتیجه منجر به موتالیسیون و آسیب DNA می‌گردد. روند پیری ناشی از صدمه‌ی آفتاب (Photoaging) درنتیجه‌ی تماس مزمن با نور فرابنفش (UV) ایجاد می‌شود و شامل تغییرات کاراکتریستک اپی‌درم و درم است^{۱۱} بنابراین Photoaging تنها ایجاد چین و چروک پوست نیست، بلکه شامل آتروفی اپی‌درم و درم، قوام خشن پوست، پیگمانانتاسیون نامنظم، شلی پوست و افزایش اندازه‌ی منافذ پوست می‌باشد.

شواهد آسیب‌شناسی نشان می‌دهد که در پوست صدمه‌دیده، نازک شدن اپی‌درم و مهم‌تر از آن تغییرات درم رخ می‌دهد که به صورت دیس‌ارگانیزه‌شدن الیاف کلژن و تجمع الیاف الاستیک و نیز تغییرات ماتریکس درم شامل کاهش در پروکلژن I و III و کلژن VII در محل اتصال درم و اپی‌درم و کاهش شبکه‌ی میکروفیبریلار غنی از فیبریلین است. همچنان تغییرات مشابهی در مویرگ‌های سطحی درم ایجاد می‌گردد که می‌تواند تلانژکتازی در سطح پوست ایجاد کند^{۱۲}.

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین راه‌های علمی پیشگیری از اثرات زیان‌بار نور خورشید استفاده از ضدآفتاب است. ضدآفتاب‌ها با SPF کافی از آسیب ناشی از اشعه‌ی فرابنفش نور خورشید پیشگیری و از تشکیل دایمراهای پیریمیدین جلوگیری می‌کنند^{۱۳}. SPF عددی است که توانایی یک محصول ضدآفتاب را در سد کردن اثرات UVB مشخص می‌کند. کاوهزاده و همکاران در گزارشی اعلام کردند اختلال در اندام‌ها موجب اختلال در خودپسندی و تصویر بدنه فرد می‌باشد. افراد با اختلال یا بخشکلی قابل رؤیت با یک برچسب نامناسب رو برو می‌شوند، تعبیرهای بدی را در

شرکت‌کننده‌ها داده شد و از ایشان خواسته شد که یکی از کرم‌ها را سمت راست و دیگری را سمت چپ صورت (شاهد و مورد) بمالند. این کار یک مرتبه دیگر ۲ ساعت پس از شروع مطالعه تکرار شد که در مجموع دو مرتبه ضدآفتاب استفاده شد. شرکت‌کننده‌گان و پزشک معاينه‌کننده از اينکه چه ضدآفتابی در کدام طرف از صورت استفاده شده بى اطلاع بودند. سپس شرکت‌کننده‌گان مجموعاً ۵ ساعت در فضای باز و در معرض هوای آفتابی قرار داشتند. تأثیر کرم‌ها بر اساس ميزان پيدايش اريتم، خارش، سوزش و ميزان رضایت (از نظر تحمل کرم‌ها) ۳ ساعت پس از مصرف توسط معاينه‌ي باليني و پرسش پزشک حاضر در محل و نيز ۲۴ ساعت پس از مصرف توسط خود ارزیابي شرکت‌کننده‌گان انجام شد.

اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون MC (از جهت تأثیر پيش‌گيري‌کننده ضدآفتاب‌ها) و با استفاده از آزمون مربع کاي (از جهت تفاوت کرم‌ها) مورد قضاوت قرار گرفت.

پس از آموزش چگونگي تشخيص آفتاب‌سوختگی به شرکت‌کننده‌گان (براساس وجود یا عدم وجود اريتم پوست صورت) به هر شرکت‌کننده پرسشنامه‌اي حاوی سؤالات تستی داده شد تا نتایج خودارزیابی ۲۴ ساعت پس از مصرف صورت گيرد.

يافته‌ها

این تحقیق بر روی ۵۰ کوهنورد داوطلب انجام گرفت که ۴۰٪ آن‌ها زن و ۶۰٪ مرد بودند. میانگین سن آن‌ها ۲۸ سال بود. از نظر ميزان تحصيلات ۸۹٪ زيرديپلم، ۹٪ دипلم و ۸۹٪ تحصيلات دانشگاهی داشتند که از ميان شرکت‌کننده‌گان ۳۸٪ از ضدآفتاب‌هاي ايراني و ۶۲٪ از ضدآفتاب‌هاي خارجي به طور معمول استفاده مي‌كردند. ارزیابي بعد از ۶ ساعت پس از شروع مطالعه نشان مي‌دهد کرم ب در ۷۶٪ نمونه‌ها و کرم الف در ۸۲٪ نمونه‌ها موجب

انتخاب آن‌ها براساس آخرین دستاوردهای علمي حفاظت کاملی را در برابر کلیه‌ی طول موج‌های اشعه‌ی فرابنفش UVB ايجاد کرده و از سوي دیگر با دارابودن نسبت UVA/UVB بزرگتر از ۰/۹۱ (دارای ۵ ستاره در سистем اندازه‌گيري Boots و مقادير $PPD > 8$) در سیستم اندازه‌گيري بين‌المللی ژاپن قدرت حفاظتی بسيار بالاي را در برابر اشعه‌ی UVA دارد.^۹ از آنجا كه روش ساخت، فرمولاتيون، كيفيت مواد مؤثر دارويي و مواد جانبی كه در تهيه‌ی فراورده‌های مختلف به کار می‌رود، به‌طور چشمگيري بر اثرات باليني آن‌ها تأثیر مي‌گذارد. ضدآفتاب‌ها نيز نظير هر محصول مراقبت از پوست می‌توانند در برخی افراد با حساسيت پوستی بالا، سبب ايجاد پاره‌ای از عوارض شوند. طبق قوانين سازمان‌های دارويي جهت حصول اطمینان از ايجاد اثرات نامناسب در مصرف‌کننده‌گان باید فراورده‌های با شكل يكسان كه توسط کارخانه‌های مختلف تولید می‌شوند با فراورده‌های مشابه استاندارد مقاييسه شوند که با نظر دیگر پژوهشگران مطابقت دارد^{۱۰}، لذا به اين منظور کرم ضدآفتاب برنده خارجي با SPF=60 (کرم الف)، با کرم ضدآفتاب SPF=50 ساخت ايران (کرم ب)، در پيش‌گيري از آفتاب‌سوختگی در كوهنوردان، مورد مقاييسه قرار گرفتند.

روش اجرا

این تحقیق به روش کارآزمایي باليني از نوع دوسوکور در هوای آفتابی و فاقد ابر در شهر شيراز در دامنه‌ی کوه دراك، برروي ۵۰ نفر کوهنورد پس از توجيه و کسب موافقت شفاهي انجام شد.

هيچ يك از شرکت‌کننده‌گان ۲۴ ساعت قبل از ورود به اين مطالعه از هيچ نوع کرمی استفاده نكرده بودند و هيچ يك سابقه‌ي حساسيت به ضدآفتاب و آفتاب‌سوختگی نداشتند. ابتدا به ميزان ۰/۴ ميلی‌لتر از کرم‌های ضدآفتاب الف و ب توسط سرنگ به



شکل ۲: میزان آفتاب‌سوختگی و پیشگیری از آفتاب‌سوختگی به تفکیک کرم‌های مصرفی

بحث

این مطالعه نشان داد که دو کرم ضدآفتاب الف و ب در پیشگیری از آفتاب‌سوختگی تفاوت چندانی نداشتند اما از نظر تأثیر برخی عوارض مانند سوزش و خارش و نیز میزان رضایت مصرف‌کنندگان، کرم ضدآفتاب ب بهتر عمل کرده و درصد رضایتمندی بیشتر از شرکت‌کنندگان را کسب کند و ۹۳٪ از شرکت‌کنندگان حاضر به معرفی این محصول به دیگر دوستان خود شدند.

در مطالعه‌ی قلمکارپور و همکاران بررسی کو亨وردان مشاهده شد که حدود ۳۷/۴٪ از نمونه‌های که از ضدآفتاب الف استفاده کرده بودند دچار آفتاب‌سوختگی شدند.^۳ هر دو کرم قدرت بلوك‌کردن اشعه‌های فرابینفش A و B و اشعه‌ی مادون قرمز را دارند و نیز هر کدام عواملی مانند ویتامین E دارند که باعث ارتقا کیفیت این کرم‌ها می‌شوند. همچنین هر دو کرم مقاوم به آب می‌باشند. ذکر این نکته ضروری است که حتی پیشگیری کامل اریتم نیز دلیل بر کافی‌بودن قدرت حفاظتی ضدآفتاب نیست زیرا مشخص شده

جدول ۱: پیشنهاد استفاده از محصول به دیگران در آزمون خودآزمایی

	معروف کرم نمی‌کنم (درصد)	معروف نمی‌کنم بی‌تفاوت (درصد)	ضدآفتاب به دیگران جمع
کرم الف	۸۲٪	۷/۷	۱۰۰
کرم ب	۹۶٪	۳	۱۰۰

پیشگیری از آفتاب‌سوختگی شدند. آزمون McNemars نشان داد که تأثیر هر کدام از کرم‌ها در پیشگیری از آفتاب‌سوختگی به لحاظ آماری معنی‌دار است ($P < 0.0005$) اما آزمون مربع کای نشان داد که میزان پیشگیری کرم‌ها در مقایسه با یکدیگر از نظر آماری معنی‌دار نبود.

از ۵۰ کوهنورد شرکت‌کننده در مطالعه‌ی همه‌ی نفرات نتایج حاصل از خودارزیابی را پس از ۲۴ ساعت را اعلام داشتند. نتایج آزمون خودآزمایی نشان می‌دهد که میزان رضایت شرکت‌کنندگان از فراورده‌ها در گروه کرم ب ۹۵٪ و در گروه کرم الف ۸۲٪ بود. همچنین نشان می‌دهد که احساس خارش در پوست صورت شرکت‌کنندگان در گروه کرم ب ۱۵٪ و نیز در گروه کرم الف ۳۵٪ بوده. همچنین در گروه کرم ب ۲۵٪ و در گروه کرم الف ۳۶٪ در صورت احساس سوزش داشتند که در شکل ۱ ارائه شده است.

در گروه کرم ب ۱۷٪ و در گروه کرم الف ۲۳٪ آفتاب‌سوختگی گزارش شد که در شکل ۲ وضعیت آن‌ها به تفکیک کرم‌های مصرفی ارائه شده است. در پرسشنامه‌ی آزمون خودآزمایی گزینه‌ی پیشنهاد استفاده‌ی محصول به دیگران وجود داشت که ۹۶٪ از شرکت‌کنندگان کرم ب و ۸۲٪ از شرکت‌کنندگان کرم الف را برای پیشنهاد به دیگران انتخاب کرده بودند که در جدول ۱ نشان داده شده است. نتایج آزمون مربع کای نشان داد که اختلاف دو گروه از نظر آماری معنی‌دار نبود.



شکل ۱: نمودار خودآرزیابی از شرکت‌کنندگان ۲۴ ساعت بعد از انجام آزمون

اما نتایج حاصل از خود ارزیابی شرکت کنندگان ۲۵٪ برای کرم ب و ۳۵٪ برای کرم الف بوده است.

تشکر و قدردانی

این تحقیق با حمایت مالی شرکت پارس حیان انجام گردید. همچنین از همکاری‌های شرکت دکتر اخوی قدردانی می‌شود.

است دوزهای اشعه کمتر از مقدار ایجادکننده‌ی اریتم (suberythemal) نیز ممکن است باعث صدمات زیان‌بار به سلول‌های پوست گردد^{۱۱}. امیر نوبخت در مقاله‌ی خود، خودارزیابی فرد غیرمتخصص را بدون دقیق برای پیشگیری از اریتم دانست و این موضوع درنتیجه‌ی این تحقیق نیز مشخص و میزان آفتاب‌سوختگی که توسط پژوهش متخصص گزارش شد، ۱۷,۸٪ برای کرم ب و ۲۳,۸٪ برای کرم الف بوده

References

1. Ahmadi F, Jorjani M. Sunblock comparison SPF=30 and SPF=100 in advance of sunburn. Pajohandeh. 2002;7-3:217 (in persian).
2. Arndt KA, LeBoit P, Robinson J, et al. Cutaneous medicine and surgery. Philadelphia: WB Saunders. USA 1996; P: 1576-77.
3. Ghalamkar F, AmirJavanbacht A, Toosi P, et al. Compare sunscreen lotis and seagul in the prevention of sunburn. Pajohandeh. 2001; 2 (5): 227-32 (in Persian).
4. Ghalamkarpour F. Investigating the effect of pulsed light on power (IPL) on the aging process caused by sun damage(Photoaging). Research in Medicine. 2007;31-2:169.
5. Weiss RA, Weiss MA, Beasley KL. Rejuvenation of photoaged skin: 5years results with intense pulsed light of the face, neck, and chest. Dermatol Surg. 2002; 28-12:1115.
6. Kavehzadeh SMH. Comparing the mental image of the body in skin patients with healthy people. Dermatology and cosmetic. 2006;7-4:213 (in persian).
7. FDA. Sun screen drug products for over the counter use:proposcd safcty.effectiveness and labeling condition Federal Register. Available from www.federalregister.gov.
8. Grifantini K. How does sunscreen work? available from ;<https://www.livescience.com/32666-how-does-sunscreen-work.html>. 2010.
9. Alsarra I. Pharmaceutics,the science of dosage form design. Saudi Pharm J. 2003;206:4-11.
10. Autier P, Severi G, Doré J-F, Boniol M. Has the sun protection factor had its day?: Information on sunscreens should warn against excessive sun exposure. BMJ. 2000; 320 (7244):1274. 80.

Comparison of two sunscreens in the prevention of sunburn

Iman Bagherpour, MSc¹
Razieh Zare, BSc²

1. Young and Elite Researchers Center,
Shiraz branch, Islamic Azad University,
Shiraz, Iran

2. Islamic Azad University, Shiraz, Iran

Background and Aim: Considering the prevalence of sunburn and its complications and the importance of preventing it, we conducted a study to compare a brand sunscreen with SPF = 60 (cream A) and a domestic sunscreen with SPF = 50 (cream B) in hikers.

Methods: The clinical trial was carried out on 50 participants in shiraz. 0.4 ml of the cream A was applied to one side of face and the same amount of cream B was applied to other side as control. The participants were exposed to the sun for 5 hours. The assessment was performed 3 hours after the onset by a dermatologist and 24 hours later by the participants themselves based on erythema, burning, itching and satisfaction with the products. The data were analyzed using McNemar and chi-square tests.

Results: Cream B in 82.2% and A in 76.2% of cases prevented sunburn. Also, the participants' satisfaction was 95% and 82% for using B and A creams, respectively. Sunscreen A and B did not show significant difference in prevention of sunburn, but side effects such as burning and itching were observed more in cream A and participants satisfaction was more with cream B.

Conclusion: Overall cream B had less side effects and participants were more satisfied with it.

Keywords: burning, itching, sunburn, sunscreen

Received: Sep 16, 2017 Accepted: Nov 25, 2017

Dermatology and Cosmetic 2017; 8 (3): 131-136

Corresponding Author:
Razieh Zare

No., 48, Motahari Sq., Radvan Complex,
Shiraz, Iran
Email: zare.ues@gmail.com

Conflict of interest: None to declare